


## (37) 防犯活動への参加状況

問 19. あなたは、問 18 であげた防犯活動のいずれかに参加していますか。(○はひとつ)

防犯活動に「参加している（よく参加・ときどき参加）」人は 2 割強

●防犯活動の参加状況について、「全く参加していない」が 53.6%で最も高い。



## 【属性別特徴】

- 「全く参加していない」の割合を性別・年代別で見ると、男性・40～44歳、男性・60～64歳、女性・30～34歳、女性・45～49歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「参加している」の割合を性別・年代別で見ると、男性・50～54歳、男性・65～74歳、女性・35～44歳、女性・70～74歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「全く参加していない」の割合をブロック別で見ると、中央東部、中央部が、全体の割合に比べて高い。
- 「参加している」の割合をブロック別で見ると、東部A、東部B、南西部、西部Aが、全体の割合に比べて高い。

7 「犯罪の防止・防犯力の向上」について

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	よく参加している	ときどき参加している	ほとんど参加していない	全く参加していない	無回答
全体		1,110 100.0	40 3.6	218 19.6	239 21.5	595 53.6	18 1.6
性別	男性	428 100.0	27 6.3	82 19.2	78 18.2	237 55.4	4 0.9
	女性	668 100.0	12 1.8	132 19.8	157 23.5	353 52.8	14 2.1
15～19歳	男性	18 100.0	0 0.0	4 22.2	2 11.1	12 66.7	0 0.0
	女性	23 100.0	0 0.0	3 13.0	5 21.7	15 65.2	0 0.0
20～24歳	男性	15 100.0	0 0.0	2 13.3	2 13.3	11 73.3	0 0.0
	女性	20 100.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	19 95.0	0 0.0
25～29歳	男性	16 100.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	14 87.5	0 0.0
	女性	20 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	19 95.0	0 0.0
30～34歳	男性	15 100.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	12 80.0	0 0.0
	女性	35 100.0	0 0.0	3 8.6	2 5.7	29 82.9	1 2.9
35～39歳	男性	26 100.0	0 0.0	3 11.5	3 11.5	20 76.9	0 0.0
	女性	52 100.0	2 3.8	14 26.9	12 23.1	24 46.2	0 0.0
40～44歳	男性	30 100.0	1 3.3	5 16.7	5 16.7	19 63.3	0 0.0
	女性	65 100.0	2 3.1	18 27.7	14 21.5	31 47.7	0 0.0
45～49歳	男性	36 100.0	2 5.6	5 13.9	10 27.8	19 52.8	0 0.0
	女性	56 100.0	0 0.0	9 16.1	12 21.4	35 62.5	0 0.0
50～54歳	男性	34 100.0	0 0.0	11 32.4	5 14.7	18 52.9	0 0.0
	女性	46 100.0	0 0.0	7 15.2	15 32.6	24 52.2	0 0.0
55～59歳	男性	34 100.0	0 0.0	5 14.7	15 44.1	14 41.2	0 0.0
	女性	60 100.0	0 0.0	13 21.7	20 33.3	27 45.0	0 0.0
60～64歳	男性	51 100.0	1 2.0	8 15.7	11 21.6	30 58.8	1 2.0
	女性	64 100.0	2 3.1	11 17.2	14 21.9	35 54.7	2 3.1
65～69歳	男性	39 100.0	5 12.8	9 23.1	7 17.9	18 46.2	0 0.0
	女性	67 100.0	1 1.5	11 16.4	20 29.9	33 49.3	2 3.0
70～74歳	男性	53 100.0	6 11.3	15 28.3	6 11.3	26 49.1	0 0.0
	女性	70 100.0	2 2.9	22 31.4	19 27.1	24 34.3	3 4.3
75～79歳	男性	28 100.0	6 21.4	9 32.1	3 10.7	9 32.1	1 3.6
	女性	40 100.0	1 2.5	9 22.5	12 30.0	17 42.5	1 2.5
80歳以上	男性	29 100.0	5 17.2	4 13.8	5 17.2	13 44.8	2 6.9
	女性	47 100.0	2 4.3	9 19.1	10 21.3	21 44.7	5 10.6

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	よく参加している	ときどき参加している	ほとんど参加していない	全く参加していない	無回答
全体		1,110 100.0	40 3.6	218 19.6	239 21.5	595 53.6	18 1.6
ブロック別	東部A	80 100.0	7 8.8	22 27.5	17 21.3	34 42.5	0 0.0
	東部B	71 100.0	5 7.0	24 33.8	15 21.1	26 36.6	1 1.4
	北部A	98 100.0	5 5.1	21 21.4	21 21.4	50 51.0	1 1.0
	北部B	64 100.0	1 1.6	10 15.6	14 21.9	37 57.8	2 3.1
	中央東部	120 100.0	2 1.7	21 17.5	17 14.2	77 64.2	3 2.5
	南東部	101 100.0	1 1.0	15 14.9	25 24.8	58 57.4	2 2.0
	中央部	151 100.0	2 1.3	16 10.6	24 15.9	107 70.9	2 1.3
	中央南部	174 100.0	6 3.4	31 17.8	37 21.3	98 56.3	2 1.1
	南西部	113 100.0	4 3.5	30 26.5	30 26.5	46 40.7	3 2.7
	西部A	48 100.0	4 8.3	11 22.9	8 16.7	24 50.0	1 2.1
	西部B	65 100.0	2 3.1	11 16.9	8 12.3	25 38.5	2 3.1


## (38) 防犯活動に参加していない理由

【問 19 で、「3」又は「4」と回答された方にお聞きします。】

問 19-1. あなたは、問 18 であげた防犯活動に参加していない理由は何ですか。(あてはまるものすべてに○)

防犯活動に参加していない理由は、「参加する時間がない」人が 5 割弱

- 防犯活動に参加していない理由について、「参加する時間がない」が 45.7%で最も高い。
- その他の内訳について、「家族の一人が参加しているため自分はしていない」や「子どもが小学校を卒業したから」、「体力がない」、「高齢のため」などの意見がみられた。



## 【属性別特徴】

- 「参加する時間がない」の割合を性別・年代別で見ると、男性・20～24歳、男性30～59歳、女性・25～34歳、女性・40～54歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「参加するきっかけが得られない」の割合を性別・年代別で見ると、男性・60～64歳、女性・30～44歳、女性・55～64歳が、全体の割合に比べて高い。

7 「犯罪の防止・防犯力の向上」について

◆表 性別・年代別◆


		サンプル数	参加する時間がない	参加するきっかけが得られない	参加したいと思わない	情報や活動内容に関する	一緒に参加できる仲間がない	身近に参加したいと思う活動や団体がない	家族や職場の理解が得られない	その他	無回答	
全体		834 100.0	381 45.7	299 35.9	115 13.8	113 13.5	93 11.2	56 6.7	4 0.5	61 7.3	57 6.8	
性別	男性	315 100.0	147 46.7	102 32.4	55 17.5	42 13.3	27 8.6	17 5.4	0 0.0	25 7.9	18 5.7	
	女性	510 100.0	229 44.9	196 38.4	59 11.6	70 13.7	65 12.7	39 7.6	4 0.8	35 6.9	37 7.3	
性別・年代別	15～19歳	男性	14 100.0	7 50.0	4 28.6	2 14.3	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1
		女性	20 100.0	9 45.0	11 55.0	2 10.0	1 5.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20～24歳	男性	13 100.0	9 69.2	8 61.5	2 15.4	3 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	19 100.0	9 47.4	9 47.4	2 10.5	4 21.1	2 10.5	1 5.3	0 0.0	1 5.3	2 10.5
	25～29歳	男性	16 100.0	7 43.8	6 37.5	3 18.8	3 18.8	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	20 100.0	13 65.0	10 50.0	4 20.0	3 15.0	2 10.0	3 15.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0
	30～34歳	男性	13 100.0	7 53.8	3 23.1	4 30.8	2 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7
		女性	31 100.0	16 51.6	15 48.4	5 16.1	4 12.9	3 9.7	2 6.5	1 3.2	0 0.0	1 3.2
	35～39歳	男性	23 100.0	12 52.2	9 39.1	6 26.1	2 8.7	0 0.0	1 4.3	0 0.0	1 4.3	2 8.7
		女性	36 100.0	18 50.0	16 44.4	5 13.9	7 19.4	6 16.7	4 11.1	0 0.0	2 5.6	0 0.0
	40～44歳	男性	24 100.0	17 70.8	6 25.0	5 20.8	1 4.2	1 4.2	1 4.2	0 0.0	0 0.0	1 4.2
		女性	45 100.0	30 66.7	20 44.4	8 17.8	4 8.9	7 15.6	2 4.4	0 0.0	2 4.4	0 0.0
	45～49歳	男性	29 100.0	18 62.1	9 31.0	5 17.2	2 6.9	1 3.4	2 6.9	0 0.0	1 3.4	1 3.4
		女性	47 100.0	29 61.7	16 34.0	2 4.3	6 12.8	6 12.8	2 4.3	0 0.0	2 4.3	1 2.1
	50～54歳	男性	23 100.0	15 65.2	8 34.8	1 4.3	3 13.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.3	2 8.7
		女性	39 100.0	24 61.5	15 38.5	3 7.7	3 7.7	3 7.7	3 7.7	1 2.6	2 5.1	0 0.0
	55～59歳	男性	29 100.0	15 51.7	11 37.9	5 17.2	3 10.3	8 27.6	0 0.0	0 0.0	3 10.3	0 0.0
		女性	47 100.0	23 48.9	24 51.1	8 17.0	2 4.3	5 10.6	2 4.3	0 0.0	1 2.1	0 0.0
	60～64歳	男性	41 100.0	17 41.5	18 43.9	2 4.9	10 24.4	3 7.3	5 12.2	0 0.0	1 2.4	2 4.9
		女性	49 100.0	22 44.9	24 49.0	5 10.2	11 22.4	7 14.3	7 14.3	0 0.0	0 0.0	2 4.1
	65～69歳	男性	25 100.0	7 28.0	7 28.0	6 24.0	6 24.0	3 12.0	2 8.0	0 0.0	1 4.0	2 8.0
		女性	53 100.0	24 45.3	15 28.3	5 9.4	12 22.6	10 18.9	3 5.7	1 1.9	3 5.7	6 11.3
	70～74歳	男性	32 100.0	10 31.3	5 15.6	11 34.4	0 0.0	1 3.1	2 6.3	0 0.0	4 12.5	2 6.3
		女性	43 100.0	10 23.3	10 23.3	4 9.3	7 16.3	6 14.0	5 11.6	0 0.0	5 11.6	7 16.3
	75～79歳	男性	12 100.0	1 8.3	4 33.3	0 0.0	4 33.3	2 16.7	1 8.3	0 0.0	3 25.0	2 16.7
		女性	29 100.0	2 6.9	5 17.2	2 6.9	4 13.8	5 17.2	2 6.9	0 0.0	5 17.2	8 27.6
	80歳以上	男性	18 100.0	2 11.1	3 16.7	3 16.7	1 5.6	3 16.7	2 11.1	0 0.0	9 50.0	2 11.1
		女性	31 100.0	0 0.0	6 19.4	4 12.9	2 6.5	1 3.2	2 6.5	0 0.0	11 35.5	9 29.0

## (39) 自殺について思うこと

問 20. 「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題である」ということについて、あなたの考えに最も近いものを選んでください。(○はひとつ)

「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題である」と思う人は7割弱

- 「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題である」について、「ややそう思う」が35.8%で最も高い。



## 【属性別特徴】

- 「ややそう思う」の割合を性別・年代別で見ると、女性・30～49歳、女性・55～64歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「そう思う」の割合を性別・年代別で見ると、男性・40～49歳、男性・55～59歳、男性・80歳以上、女性・50～54歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「ややそう思わない」の割合を性別・年代別で見ると、女性・40～44歳が全体の割合に比べて高い。
- 「ややそう思う」の割合をブロック別で見ると、北部Aが全体の割合に比べて高い。
- 「そう思う」の割合をブロック別で見ると、東部A、西部Aが、全体の割合に比べて高い。

## 8 「自殺予防」について

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	そう思う	ややそう思う	ややそう思わない	そう思わない	わからない	無回答
全体		1,275 100.0	400 31.4	457 35.8	83 6.5	90 7.1	189 14.8	56 4.4
性別	男性	491 100.0	176 35.8	167 34.0	34 6.9	41 8.4	59 12.0	14 2.9
	女性	766 100.0	221 28.9	284 37.1	48 6.3	47 6.1	127 16.6	39 5.1
15～19歳	男性	21 100.0	6 28.6	7 33.3	3 14.3	2 9.5	2 9.5	1 4.8
	女性	27 100.0	16 59.3	8 29.6	2 7.4	0 0.0	1 3.7	0 0.0
20～24歳	男性	18 100.0	6 33.3	4 22.2	2 11.1	4 22.2	2 11.1	0 0.0
	女性	24 100.0	5 20.8	9 37.5	4 16.7	4 16.7	2 8.3	0 0.0
25～29歳	男性	17 100.0	9 52.9	4 23.5	2 11.8	2 11.8	0 0.0	0 0.0
	女性	28 100.0	15 53.6	8 28.6	1 3.6	4 14.3	0 0.0	0 0.0
30～34歳	男性	19 100.0	4 21.1	8 42.1	3 15.8	3 15.8	1 5.3	0 0.0
	女性	38 100.0	7 18.4	17 44.7	4 10.5	5 13.2	5 13.2	0 0.0
35～39歳	男性	33 100.0	9 27.3	13 39.4	5 15.2	4 12.1	2 6.1	0 0.0
	女性	59 100.0	17 28.8	25 42.4	4 6.8	5 8.5	8 13.6	0 0.0
40～44歳	男性	32 100.0	13 40.6	12 37.5	3 9.4	2 6.3	2 6.3	0 0.0
	女性	71 100.0	19 26.8	29 40.8	10 14.1	7 9.9	6 8.5	0 0.0
45～49歳	男性	43 100.0	17 39.5	16 37.2	3 7.0	4 9.3	3 7.0	0 0.0
	女性	61 100.0	15 24.6	30 49.2	6 9.8	4 6.6	6 9.8	0 0.0
50～54歳	男性	40 100.0	14 35.0	16 40.0	2 5.0	3 7.5	5 12.5	0 0.0
	女性	50 100.0	19 38.0	16 32.0	5 10.0	3 6.0	7 14.0	0 0.0
55～59歳	男性	35 100.0	16 45.7	11 31.4	4 11.4	1 2.9	3 8.6	0 0.0
	女性	63 100.0	18 28.6	35 55.6	2 3.2	2 3.2	5 7.9	1 1.6
60～64歳	男性	56 100.0	20 35.7	22 39.3	2 3.6	5 8.9	7 12.5	0 0.0
	女性	65 100.0	16 24.6	30 46.2	5 7.7	1 1.5	13 20.0	0 0.0
65～69歳	男性	46 100.0	16 34.8	17 37.0	2 4.3	5 10.9	3 6.5	3 6.5
	女性	75 100.0	19 25.3	29 38.7	3 4.0	1 1.3	21 28.0	2 2.7
70～74歳	男性	61 100.0	18 29.5	17 27.9	3 4.9	3 4.9	17 27.9	3 4.9
	女性	87 100.0	25 28.7	29 33.3	0 0.0	3 3.4	23 26.4	7 8.0
75～79歳	男性	29 100.0	10 34.5	10 34.5	0 0.0	1 3.4	6 20.7	2 6.9
	女性	53 100.0	13 24.5	8 15.1	1 1.9	4 7.5	12 22.6	15 28.3
80歳以上	男性	36 100.0	16 44.4	9 25.0	0 0.0	1 2.8	6 16.7	4 11.1
	女性	62 100.0	16 25.8	9 14.5	1 1.6	4 6.5	18 29.0	14 22.6

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	そう思う	ややそう思う	ややそう思わない	そう思わない	わからない	無回答
全体		1,275 100.0	400 31.4	457 35.8	83 6.5	90 7.1	189 14.8	56 4.4
ブロック別	東部A	91 100.0	34 37.4	25 27.5	3 3.3	6 6.6	18 19.8	5 5.5
	東部B	80 100.0	25 31.3	30 37.5	5 6.3	5 6.3	12 15.0	3 3.8
	北部A	113 100.0	32 28.3	51 45.1	7 6.2	7 6.2	15 13.3	1 0.9
	北部B	72 100.0	20 27.8	27 37.5	3 4.2	6 8.3	12 16.7	4 5.6
	中央東部	140 100.0	42 30.0	43 30.7	20 14.3	7 5.0	20 14.3	8 5.7
	南東部	108 100.0	34 31.5	41 38.0	5 4.6	10 9.3	12 11.1	6 5.6
	中央部	177 100.0	46 26.0	70 39.5	15 8.5	14 7.9	26 14.7	6 3.4
	中央南部	205 100.0	71 34.6	74 36.1	13 6.3	14 6.8	27 13.2	6 2.9
	南西部	125 100.0	38 30.4	43 34.4	6 4.8	9 9.6	12 16.8	5 4.0
	西部A	55 100.0	22 40.0	13 23.6	2 3.6	2 3.6	11 20.0	5 9.1
	西部B	74 100.0	26 35.1	24 32.4	3 4.1	5 6.8	11 14.9	5 6.8

## 【設問間別特徴】

- 「そう思う」の割合を「ゲートキーパー」の認知状況別でみると、ゲートキーパーの研修を受けたことがある、研修を受講したいと思う人が、全体の割合に比べて高い。

◆表 「ゲートキーパー」の認知状況別◆

		サンプル数	そう思う	ややそう思う	ややそう思わない	そう思わない	わからない	無回答
全 体		1,275 100.0	400 31.4	457 35.8	83 6.5	90 7.1	189 14.8	56 4.4
「ゲートキーパー」の 認知状況別	ゲートキーパー研修を受けたことがあり、知っている	20 100.0	<b>12</b> <b>60.0</b>	7 35.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0
	名称を聞いたことがあり、研修を受講したいと思う	26 100.0	<b>13</b> <b>50.0</b>	9 34.6	2 7.7	2 7.7	0 0.0	0 0.0
	名称を聞いたことがあるが、研修を受講したいとは思わない	99 100.0	34 34.3	<b>43</b> <b>43.4</b>	<b>13</b> <b>13.1</b>	3 3.0	5 5.1	1 1.0
	名称を聞いたことはないが、研修を受講したいと思う	71 100.0	<b>30</b> <b>42.3</b>	26 36.6	6 8.5	7 9.9	2 2.8	0 0.0
	名称を聞いたことはなく、研修を受講したいとも思わない	80 100.0	19 23.8	<b>33</b> <b>41.3</b>	7 8.8	7 11.3	9 12.5	10 2.5
	名称を聞いたことはなく、何かよくわからない	901 100.0	278 30.9	331 36.7	51 5.7	62 6.9	159 17.6	20 2.2


## 8 「自殺予防」について

### (40) こころの病を感じたときに利用したい専門窓口

問 21. あなたは、もし、ご自身がこころの病を感じたとき、どの専門窓口を利用したいと思いますか。(〇はひとつ)

利用したい専門窓口は、「精神科や心療内科等の医療機関」が 5 割弱

- こころの病を感じたときに利用したい専門窓口について、「精神科や心療内科等の医療機関」が 47.4%で最も高い。



#### 【属性別特徴】

- 「精神科や心療内科等の医療機関」の割合を性別・年代別で見ると、男性・40～49歳、女性・35～64歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「かかりつけの医療機関」の割合を性別・年代別で見ると、男性・70～74歳、男性・80歳以上、女性・70歳以上が、全体の割合に比べて高い。
- 「精神科や心療内科等の医療機関」の割合をブロック別で見ると、北部B、西部Bが、全体の割合に比べて高い。
- 「かかりつけの医療機関」の割合をブロック別で見ると、南東部、西部Aが、全体の割合に比べて高い。



◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	除(かかりつけ医の医療機関を)	精神科や心療内科等の医療機関	保健所等の公的機関の相談窓口	の電話相談窓口	SNSの相談窓口	その他	利用しない	無回答
全体		1,275 100.0	271 21.3	604 47.4	39 3.1	99 7.8	38 3.0	35 2.7	145 11.4	44 3.5
性別	男性	491 100.0	110 22.4	221 45.0	15 3.1	38 7.7	18 3.7	11 2.2	64 13.0	14 2.9
	女性	766 100.0	156 20.4	379 49.5	23 3.0	60 7.8	19 2.5	22 2.9	79 10.3	28 3.7
15~19歳	男性	21 100.0	5 23.8	6 28.6	0 0.0	1 4.8	<b>4</b> <b>19.0</b>	0 0.0	<b>5</b> <b>23.8</b>	0 0.0
	女性	27 100.0	7 25.9	10 37.0	1 3.7	<b>5</b> <b>18.5</b>	1 3.7	2 7.4	1 3.7	0 0.0
20~24歳	男性	18 100.0	2 11.1	5 27.8	0 0.0	2 11.1	<b>4</b> <b>22.2</b>	1 5.6	<b>4</b> <b>22.2</b>	0 0.0
	女性	24 100.0	2 8.3	<b>13</b> <b>54.2</b>	1 4.2	2 8.3	1 4.2	0 0.0	<b>5</b> <b>20.8</b>	0 0.0
25~29歳	男性	17 100.0	3 17.6	4 23.5	1 5.9	<b>3</b> <b>17.6</b>	0 0.0	<b>2</b> <b>11.8</b>	<b>4</b> <b>23.5</b>	0 0.0
	女性	28 100.0	2 7.1	<b>16</b> <b>57.1</b>	1 3.6	1 3.6	<b>3</b> <b>10.7</b>	1 3.6	4 14.3	0 0.0
30~34歳	男性	19 100.0	3 15.8	<b>11</b> <b>57.9</b>	<b>2</b> <b>10.5</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 15.8	0 0.0
	女性	38 100.0	5 13.2	17 44.7	1 2.6	1 2.6	<b>4</b> <b>10.5</b>	2 5.3	<b>8</b> <b>21.1</b>	0 0.0
35~39歳	男性	33 100.0	5 15.2	17 51.5	1 3.0	1 3.0	2 6.1	<b>3</b> <b>9.1</b>	4 12.1	0 0.0
	女性	59 100.0	6 10.2	<b>34</b> <b>57.6</b>	2 3.4	4 6.8	3 5.1	1 1.7	8 13.6	1 1.7
40~44歳	男性	32 100.0	2 6.3	<b>21</b> <b>65.6</b>	1 3.1	3 9.4	2 6.3	0 0.0	2 6.3	1 3.1
	女性	71 100.0	11 15.5	<b>44</b> <b>62.0</b>	1 1.4	6 8.5	2 2.8	0 0.0	7 9.9	0 0.0
45~49歳	男性	43 100.0	7 16.3	<b>23</b> <b>53.5</b>	1 2.3	4 9.3	<b>4</b> <b>9.3</b>	0 0.0	4 9.3	0 0.0
	女性	61 100.0	4 6.6	<b>39</b> <b>63.9</b>	2 3.3	2 3.3	3 4.9	2 3.3	9 14.8	0 0.0
50~54歳	男性	40 100.0	9 22.5	19 47.5	2 5.0	3 7.5	0 0.0	0 0.0	<b>7</b> <b>17.5</b>	0 0.0
	女性	50 100.0	6 12.0	<b>30</b> <b>60.0</b>	0 0.0	<b>8</b> <b>16.0</b>	1 2.0	2 4.0	3 6.0	0 0.0
55~59歳	男性	35 100.0	6 17.1	18 51.4	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	4 11.4	0 0.0
	女性	63 100.0	8 12.7	<b>33</b> <b>52.4</b>	2 3.2	<b>12</b> <b>19.0</b>	0 0.0	0 0.0	7 11.1	1 1.6
60~64歳	男性	56 100.0	11 19.6	29 51.8	0 0.0	<b>9</b> <b>16.1</b>	0 0.0	1 1.8	5 8.9	1 1.8
	女性	65 100.0	12 18.5	<b>36</b> <b>55.4</b>	2 3.1	4 6.2	0 0.0	3 4.6	7 10.8	1 1.5
65~69歳	男性	46 100.0	8 17.4	18 39.1	2 4.3	<b>7</b> <b>15.2</b>	0 0.0	2 4.3	6 13.0	3 6.5
	女性	75 100.0	15 20.0	35 46.7	0 0.0	9 12.0	1 1.3	5 6.7	8 10.7	2 2.7
70~74歳	男性	61 100.0	<b>21</b> <b>34.4</b>	20 32.8	1 1.6	2 3.3	0 0.0	0 0.0	<b>14</b> <b>23.0</b>	3 4.9
	女性	87 100.0	<b>31</b> <b>35.6</b>	40 46.0	2 2.3	3 3.4	0 0.0	3 3.4	6 6.9	2 2.3
75~79歳	男性	29 100.0	<b>13</b> <b>44.8</b>	<b>16</b> <b>55.2</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性	53 100.0	<b>25</b> <b>47.2</b>	13 24.5	3 5.7	0 0.0	0 0.0	1 1.9	3 5.7	8 15.1
80歳以上	男性	36 100.0	<b>13</b> <b>36.1</b>	12 33.3	2 5.6	1 2.8	0 0.0	1 2.8	2 5.6	5 13.9
	女性	62 100.0	<b>22</b> <b>35.5</b>	17 27.4	<b>5</b> <b>8.1</b>	3 4.8	0 0.0	0 0.0	3 4.8	12 19.4

## 8 「自殺予防」について

◆表 ブロック別◆

	サンプル数	除(精神科や心療内科等を	かかりつけ医の医療機関	精神科や心療内科等の医療機関	保健所等の公的機関の相談窓口	いのちの電話相談窓口	SNSの相談窓口	その他	利用しない	無回答
全体	1,275 100.0	271 21.3	604 47.4	39 3.1	99 7.8	38 3.0	35 2.7	145 11.4	44 3.5	
ブロック別	東部A	91 100.0	21 23.1	45 49.5	3 3.3	6 6.6	0 0.0	2 2.2	9 9.9	5 5.5
	東部B	80 100.0	17 21.3	34 42.5	0 0.0	10 12.5	2 2.5	2 2.5	10 12.5	5 6.3
	北部A	113 100.0	20 17.7	50 44.2	6 5.3	14 12.4	7 6.2	3 2.7	12 10.6	1 0.9
	北部B	72 100.0	12 16.7	<b>38</b> <b>52.8</b>	1 1.4	<b>11</b> <b>15.3</b>	0 0.0	0 0.0	8 11.1	2 2.8
	中央東部	140 100.0	30 21.4	66 47.1	5 3.6	11 7.9	2 1.4	1 0.7	20 14.3	5 3.6
	南東部	108 100.0	<b>30</b> <b>27.8</b>	45 41.7	4 3.7	6 5.6	2 1.9	5 4.6	14 13.0	2 1.9
	中央部	177 100.0	34 19.2	91 51.4	8 4.5	10 5.6	7 4.0	5 2.8	16 9.0	6 3.4
	中央南部	205 100.0	42 20.5	106 51.7	5 2.4	14 6.8	5 2.4	7 3.4	19 9.3	7 3.4
	南西部	125 100.0	28 22.4	49 39.2	4 3.2	11 8.8	6 4.8	4 3.2	19 15.2	4 3.2
	西部A	55 100.0	<b>15</b> <b>27.3</b>	26 47.3	0 0.0	3 5.5	1 1.8	2 3.6	4 7.3	4 7.3
	西部B	74 100.0	12 16.2	<b>43</b> <b>58.1</b>	1 1.4	1 1.4	4 5.4	2 2.7	9 12.2	2 2.7

## 【設問間別特徴】

- 「精神科や心療内科等の医療機関」の割合を自殺願望又は自殺未遂の経験別でみると、自殺したいと思ったことがある人が全体の割合に比べて高い。
- 「利用しない」の割合を自殺願望又は自殺未遂の経験別でみると、自殺未遂の経験がある人が全体の割合に比べて高い。
- 「精神科や心療内科等の医療機関」の割合を「ゲートキーパー」の認知状況別でみると、名称を聞いたことはないが、研修を受講したいと思う、名称を聞いたことはなく、研修を受講しようとも思わない人が、全体の割合に比べて高い。

◆表 自殺願望又は自殺未遂の経験別◆

		サンプル数	除（精神科や心療内科等の医療機関を関	かかりつけ医の医療機関	療精神科や心療内科等の医療機関	保健所等の公的機関の相談窓口	の電話相談窓口等民間機関	SNSの相談窓口	その他	利用しない	無回答
全体		1,275 100.0	271 21.3	604 47.4	39 3.1	99 7.8	38 3.0	35 2.7	145 11.4	44 3.5	
は自殺願望又は自殺未遂の経験別	自殺未遂の経験がある	28 100.0	4 14.3	11 39.3	1 3.6	2 7.1	2 7.1	0 0.0	8 28.6	0 0.0	
	自殺したいと思ったことがある	291 100.0	43 14.8	156 53.6	7 2.4	23 7.9	9 3.1	8 2.7	44 15.1	1 0.3	
	自殺したいと思ったことがない	906 100.0	215 23.7	428 47.2	30 3.3	74 8.2	27 3.0	27 3.0	90 9.9	15 1.7	

◆表 「ゲートキーパー」の認知状況別◆

		サンプル数	除（精神科や心療内科等の医療機関を関	かかりつけ医の医療機関	療精神科や心療内科等の医療機関	保健所等の公的機関の相談窓口	の電話相談窓口等民間機関	SNSの相談窓口	その他	利用しない	無回答
全体		1,275 100.0	271 21.3	604 47.4	39 3.1	99 7.8	38 3.0	35 2.7	145 11.4	44 3.5	
「ゲートキーパー」の認知状況別	ゲートキーパー研修を受けたことがあり、知っている	20 100.0	5 25.0	7 35.0	5 25.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	
	名称を聞いたことがあり、研修を受講したいと思う	26 100.0	4 15.4	18 69.2	0 0.0	1 3.8	1 3.8	0 0.0	2 7.7	0 0.0	
	名称を聞いたことがあるが、研修を受講したいとは思わない	99 100.0	22 22.2	47 47.5	3 3.0	7 7.1	3 3.0	2 2.0	14 14.1	1 1.0	
	名称を聞いたことはないが、研修を受講したいと思う	71 100.0	7 9.9	39 54.9	5 7.0	9 12.7	4 5.6	2 2.8	5 7.0	0 0.0	
	名称を聞いたことはなく、研修を受講したいと思わない	80 100.0	19 23.8	44 55.0	1 1.3	7 8.8	0 0.0	0 0.0	6 7.5	3 3.8	
	名称を聞いたことはなく、何かよくわからない	901 100.0	190 21.1	431 47.8	23 2.6	71 7.9	30 3.3	29 3.2	113 12.5	14 1.6	

## 8 「自殺予防」について


### (4 1) 医療機関や相談窓口を利用しない理由

【問 21 で、「7」と回答された方にお聞きします。】

問 21-1. あなたが、医療機関や相談窓口を利用しない理由は何ですか。(あてはまるものすべてに○)

医療機関や相談窓口を利用しない理由は「根本的な問題解決にはならないから」が4割強、「精神的な悩みを話すことに抵抗がある」が3割弱

- 医療機関や相談窓口を利用しない理由について、「根本的な解決にはならないから」が43.4%で最も高い。
- その他の内訳について、「信頼できる人に相談したり、日頃から予防している」や「家族に相談」、「知り合いがいるかもしれないので利用できない」などの意見がみられた。



#### 【属性別特徴】

- 「治療をしなくても、ほとんどのこころの病は自然に治ると思う」の割合を性別でみると、男性が高い。

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	根本的な問題解決にはならない	精神的な悩みを話すことに抵抗がある	治療をしながらも、ほとんどの病は自然に治ると思う	治療をしないで済む、ほとんどの病は自然に治ると思う	わが家の窓口を利用したらいいかわからない	お金がかかることは避けたい	時間の都合がつかない	病気の病は特別な人がかからない	この病は特別な人がかからない	過去に利用して、嫌な思いをしたことがある	その他	無回答	
全体		145 100.0	63 43.4	39 26.9	30 20.7	21 14.5	11 7.6	8 5.5	7 4.8	3 2.1	17 11.7	3 2.1			
性別	男性	64 100.0	29 45.3	16 25.0	20 31.3	5 7.8	3 4.7	3 4.7	7 10.9	1 1.6	6 9.4	1 1.6			
	女性	79 100.0	34 43.0	22 27.8	9 11.4	16 20.3	8 10.1	5 6.3	0 0.0	2 2.5	11 13.9	2 2.5			
性別・年代別	15～19歳	男性	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	20～24歳	男性	4 100.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
		女性	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	25～29歳	男性	4 100.0	3 75.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
		女性	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30～34歳	男性	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	8 100.0	4 50.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	35～39歳	男性	4 100.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	8 100.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0
	40～44歳	男性	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
		女性	7 100.0	6 85.7	1 14.3	0 0.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	45～49歳	男性	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	9 100.0	4 44.4	3 33.3	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0
	50～54歳	男性	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0
		女性	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	55～59歳	男性	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	7 100.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60～64歳	男性	5 100.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～69歳	男性	6 100.0	2 33.3	3 50.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	8 100.0	4 50.0	4 50.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	70～74歳	男性	14 100.0	6 42.9	4 28.6	6 42.9	1 7.1	0 0.0	0 0.0	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0
		女性	6 100.0	0 0.0	3 50.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
75～79歳	男性	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	女性	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	
80歳以上	男性	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	
	女性	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	

## 8 「自殺予防」について

### 【設問間別特徴】

- 「お金がかかることは避けたい」の割合を自殺願望又は自殺未遂の経験別で見ると、自殺したいと思ったことがある人が全体の割合に比べて高い。

◆表 自殺願望又は自殺未遂の経験別◆


		サンプル数	根本的な問題解決にはならない	精神的な悩みを話すことに抵抗がある	治療をしても、ほとんどの病は自然に治ると思う	どの窓口を利用したらいいかわからない	お金がかかることは避けたい	時間の都合がつかない	病気の病は特別な人がかかると、自分には関係ない	過去に利用して、嫌な思いをしたことがある	その他	無回答
全体		145 100.0	63 43.4	39 26.9	30 20.7	21 14.5	11 7.6	8 5.5	7 4.8	3 2.1	17 11.7	3 2.1
自殺願望又は自殺未遂の経験別	自殺未遂の経験がある	8 100.0	4 50.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	自殺したいと思ったことがある	44 100.0	19 43.2	14 31.8	6 13.6	3 6.8	7 15.9	1 2.3	0 0.0	2 4.5	5 11.4	1 2.3
	自殺したいと思ったことがない	90 100.0	39 43.3	21 23.3	21 23.3	16 17.8	2 2.2	5 5.6	6 6.7	1 1.1	11 12.2	1 1.1

## (42) 家族や知人のこころの病を知ったときの対応

問 22. あなたは、家族や知人がこころの病を知ったとき、医療機関や相談窓口へ行くことを勧めますか。(〇はひとつ)

こころの病の疑いがある家族や知人に、「精神科医の受診を勧める」人は5割弱

- こころの病の疑いがある家族や知人に医療機関や相談窓口を勧めるかについて、「精神科医の受診を勧める」が45.4%で最も高い。



## 【属性別特徴】

- 「精神科の受診を勧める」の割合を性別・年代別で見ると、男性・35～44歳、男性・50～59歳、女性・30～39歳、女性・45～54歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「相談窓口を勧める」の割合を性別・年代別で見ると、男性・65～69歳、女性・75～79歳が、全体の割合に比べて高い。

## 8 「自殺予防」について

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	精神科医の受診を勧める	内科等のかかりつけ医の受診を勧める	相談窓口を勧める	勧めない	わからない	無回答
全体		1,275 100.0	579 45.4	169 13.3	227 17.8	37 2.9	205 16.1	58 4.5
性別	男性	491 100.0	232 47.3	62 12.6	92 18.7	16 3.3	76 15.5	13 2.6
	女性	766 100.0	342 44.6	104 13.6	131 17.1	19 2.5	127 16.6	43 5.6
15～19歳	男性	21 100.0	6 28.6	4 19.0	6 28.6	0 0.0	5 23.8	0 0.0
	女性	27 100.0	12 44.4	1 3.7	8 29.6	0 0.0	6 22.2	0 0.0
20～24歳	男性	18 100.0	8 44.4	0 0.0	5 27.8	0 0.0	5 27.8	0 0.0
	女性	24 100.0	14 58.3	2 8.3	3 12.5	1 4.2	4 16.7	0 0.0
25～29歳	男性	17 100.0	7 41.2	2 11.8	4 23.5	0 0.0	4 23.5	0 0.0
	女性	28 100.0	20 71.4	2 7.1	2 7.1	0 0.0	4 14.3	0 0.0
30～34歳	男性	19 100.0	12 63.2	1 5.3	3 15.8	2 10.5	1 5.3	0 0.0
	女性	38 100.0	23 60.5	2 5.3	4 10.5	4 10.5	5 13.2	0 0.0
35～39歳	男性	33 100.0	19 57.6	3 9.1	4 12.1	2 6.1	5 15.2	0 0.0
	女性	59 100.0	35 59.3	6 10.2	5 8.5	4 6.8	8 13.6	1 1.7
40～44歳	男性	32 100.0	22 68.8	1 3.1	4 12.5	0 0.0	5 15.6	0 0.0
	女性	71 100.0	33 46.5	11 15.5	13 18.3	2 2.8	12 16.9	0 0.0
45～49歳	男性	43 100.0	21 48.8	2 4.7	9 20.9	1 2.3	10 23.3	0 0.0
	女性	61 100.0	34 55.7	4 6.6	9 14.8	4 6.6	10 16.4	0 0.0
50～54歳	男性	40 100.0	21 52.5	3 7.5	6 15.0	2 5.0	8 20.0	0 0.0
	女性	50 100.0	27 54.0	9 18.0	9 18.0	2 4.0	3 6.0	0 0.0
55～59歳	男性	35 100.0	19 54.3	3 8.6	7 20.0	1 2.9	5 14.3	0 0.0
	女性	63 100.0	28 44.4	6 9.5	12 19.0	0 0.0	17 27.0	0 0.0
60～64歳	男性	56 100.0	28 50.0	9 16.1	10 17.9	1 1.8	5 8.9	3 5.4
	女性	65 100.0	29 44.6	9 13.8	10 15.4	0 0.0	16 24.6	1 1.5
65～69歳	男性	46 100.0	15 32.6	5 10.9	13 28.3	3 6.5	7 15.2	3 6.5
	女性	75 100.0	29 38.7	16 21.3	16 21.3	0 0.0	12 16.0	2 2.7
70～74歳	男性	61 100.0	25 41.0	13 21.3	8 13.1	4 6.6	9 14.8	2 3.3
	女性	87 100.0	30 34.5	15 17.2	15 17.2	2 2.3	15 17.2	10 11.5
75～79歳	男性	29 100.0	13 44.8	7 24.1	6 20.7	0 0.0	2 6.9	1 3.4
	女性	53 100.0	12 22.6	10 18.9	13 24.5	0 0.0	6 11.3	12 22.6
80歳以上	男性	36 100.0	14 38.9	7 19.4	7 19.4	0 0.0	5 13.9	3 8.3
	女性	62 100.0	14 22.6	11 17.7	11 17.7	0 0.0	9 14.5	17 27.4



## 【設問間別特徴】

- 「精神科医の受診を勧める」の割合を「ゲートキーパー」の認知状況別でみると、ゲートキーパーの名称を聞いたことはないが、研修を受講したいと思う人、研修を受講したいとも思わない人が、全体の割合に比べて高い。
- 「相談窓口を勧める」の割合を「ゲートキーパー」の認知状況別でみると、ゲートキーパーの名称を聞いたことはないが、研修を受講したいと思う人が、全体の割合に比べて高い。

◆表 「ゲートキーパー」の認知状況別◆

	サンプル数	精神科医の受診を勧める	内科等のかかりつけ医の受診を勧める	相談窓口を勧める	勧めない	わからない	無回答	
全体	1,275 100.0	579 45.4	169 13.3	227 17.8	37 2.9	205 16.1	58 4.5	
「ゲートキーパー」の認知状況別	ゲートキーパー研修を受けたことがあり、知っている	20 100.0	7 35.0	3 15.0	8 40.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0
	名称を聞いたことがあり、研修を受講したいと思う	26 100.0	16 61.5	6 23.1	3 11.5	1 3.8	0 0.0	0 0.0
	名称を聞いたことがあるが、研修を受講したいとは思わない	99 100.0	49 49.5	20 20.2	18 18.2	2 2.0	9 9.1	1 1.0
	名称を聞いたことはないが、研修を受講したいと思う	71 100.0	37 52.1	5 7.0	21 29.6	1 1.4	7 9.9	0 0.0
	名称を聞いたことはなく、研修を受講したいとも思わない	80 100.0	42 52.5	5 6.3	14 17.5	4 5.0	12 15.0	3 3.8
	名称を聞いたことはなく、何かよくわからない	901 100.0	410 45.5	124 13.8	156 17.3	28 3.1	163 18.1	20 2.2

## 8 「自殺予防」について


### (43) 自殺願望又は自殺未遂の経験

問 23. あなたは、これまでの人生の中で、自殺したいと思った又は自殺未遂の経験がありますか。

(○はひとつ)

「自殺未遂の経験がある」又は「自殺したいと思ったことがある」人は3割弱

●自殺願望又は自殺未遂の経験について、「自殺したいと思ったことがない」が71.1%で最も高い。



#### 【属性別特徴】

●「自殺したいと思ったことがない」の割合を性別・年代別で見ると、男性・35～39歳、男性・45～54歳、男性・60～69歳、女性・55～59歳、女性・65～69歳が、全体の割合に比べて高い。

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	自殺未遂の経験がある	自殺したと思った	自殺したいと思った	無回答
全体		1,275 100.0	28 2.2	291 22.8	906 71.1	50 3.9
性別	男性	491 100.0	8 1.6	110 22.4	361 73.5	12 2.4
	女性	766 100.0	20 2.6	177 23.1	534 69.7	35 4.6
15～19歳	男性	21 100.0	1 4.8	5 23.8	15 71.4	0 0.0
	女性	27 100.0	0 0.0	4 14.8	<b>23</b> <b>85.2</b>	0 0.0
20～24歳	男性	18 100.0	1 5.6	<b>7</b> <b>38.9</b>	10 55.6	0 0.0
	女性	24 100.0	0 0.0	6 25.0	18 75.0	0 0.0
25～29歳	男性	17 100.0	1 5.9	<b>5</b> <b>29.4</b>	11 64.7	0 0.0
	女性	28 100.0	1 3.6	<b>11</b> <b>39.3</b>	16 57.1	0 0.0
30～34歳	男性	19 100.0	0 0.0	4 21.1	<b>15</b> <b>78.9</b>	0 0.0
	女性	38 100.0	<b>3</b> <b>7.9</b>	<b>14</b> <b>36.8</b>	21 55.3	0 0.0
35～39歳	男性	33 100.0	0 0.0	6 18.2	<b>27</b> <b>81.8</b>	0 0.0
	女性	59 100.0	2 3.4	<b>25</b> <b>42.4</b>	32 54.2	0 0.0
40～44歳	男性	32 100.0	0 0.0	<b>10</b> <b>31.3</b>	22 68.8	0 0.0
	女性	71 100.0	3 4.2	<b>21</b> <b>29.6</b>	47 66.2	0 0.0
45～49歳	男性	43 100.0	0 0.0	9 20.9	<b>34</b> <b>79.1</b>	0 0.0
	女性	61 100.0	2 3.3	17 27.9	42 68.9	0 0.0
50～54歳	男性	40 100.0	0 0.0	8 20.0	<b>32</b> <b>80.0</b>	0 0.0
	女性	50 100.0	<b>4</b> <b>8.0</b>	9 18.0	37 74.0	0 0.0
55～59歳	男性	35 100.0	1 2.9	<b>14</b> <b>40.0</b>	20 57.1	0 0.0
	女性	63 100.0	1 1.6	13 20.6	<b>49</b> <b>77.8</b>	0 0.0
60～64歳	男性	56 100.0	2 3.6	8 14.3	<b>45</b> <b>80.4</b>	1 1.8
	女性	65 100.0	2 3.1	12 18.5	49 75.4	2 3.1
65～69歳	男性	46 100.0	0 0.0	8 17.4	<b>35</b> <b>76.1</b>	3 6.5
	女性	75 100.0	1 1.3	13 17.3	<b>60</b> <b>80.0</b>	1 1.3
70～74歳	男性	61 100.0	2 3.3	14 23.0	40 65.6	5 8.2
	女性	87 100.0	1 1.1	16 18.4	63 72.4	7 8.0
75～79歳	男性	29 100.0	0 0.0	2 6.9	<b>26</b> <b>89.7</b>	1 3.4
	女性	53 100.0	0 0.0	5 9.4	37 69.8	11 20.8
80歳以上	男性	36 100.0	0 0.0	9 25.0	25 69.4	2 5.6
	女性	62 100.0	0 0.0	10 16.1	38 61.3	14 22.6

## 8 「自殺予防」について

### 【設問間別特徴】

- 「自殺をしたいと思っただことがない」の割合をこころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別で見ると、こころの病気を感じたときに、かかりつけ医の医療機関、保健所等の公的機関の相談窓口を利用したい人が、全体の割合に比べて高い。
- 「自殺をしたいと思っただことがある」の割合をこころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別で見ると、こころの病気を感じたときに、相談機関を利用しない人が、全体の割合に比べて高い。

◆表 こころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別◆

		サンプル数	自殺未遂の経験がある	自殺がしたいと思っただ	自殺がしたいと思っただ	無回答
全 体		1,275 100.0	28 2.2	291 22.8	906 71.1	50 3.9
こころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別	かかりつけ医の医療機関 (精神科や心療内科等を除く)	271 100.0	4 1.5	43 15.9	<b>215</b> <b>79.3</b>	9 3.3
	精神科や心療内科等の医療機関	604 100.0	11 1.8	156 25.8	428 70.9	9 1.5
	保健所等の公的機関の相談窓口	39 100.0	1 2.6	7 17.9	<b>30</b> <b>76.9</b>	1 2.6
	いのちの電話等民間機関の 電話相談窓口	99 100.0	2 2.0	23 23.2	74 74.7	0 0.0
	SNSの相談窓口	38 100.0	2 5.3	9 23.7	27 71.1	0 0.0
	その他	35 100.0	0 0.0	8 22.9	<b>27</b> <b>77.1</b>	0 0.0
	利用しない	145 100.0	8 5.5	<b>44</b> <b>30.3</b>	90 62.1	3 2.1


## (44) 自殺したいと思った原因

【問23で、「1」又は「2」と回答された方にお聞きします。】

問23-1. あなたが、自殺したいと思った原因は何ですか。(あてはまるものすべてに○)

自殺したいと思った原因は、「家庭に関すること」が4割強

- 自殺したいと思った原因について、「家庭に関すること」が43.9%で最も高く、次いで「勤務に関すること」が26.3%と続く。
- その他の内訳について、「自分の存在価値」や「人間関係」、「うつ病になったから」などの意見がみられた。



## 【属性別特徴】

- 「勤務に関すること」、「経済的な問題に関すること」の割合を性別で見ると、男性が高い。
- 「家庭に関すること」の割合を性別で見ると、女性が高い。

## 8 「自殺予防」について

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	家庭に関すること	勤務に関すること	と経済的な問題に関すること	学校に関すること	恋愛や結婚に関すること	健康に関すること	その他	無回答
全体		319 100.0	140 43.9	84 26.3	70 21.9	57 17.9	36 11.3	34 10.7	33 10.3	3 0.9
性別	男性	118 100.0	33 28.0	<b>50</b> <b>42.4</b>	<b>37</b> <b>31.4</b>	16 13.6	5 4.2	13 11.0	8 6.8	1 0.8
	女性	197 100.0	<b>105</b> <b>53.3</b>	34 17.3	33 16.8	40 20.3	31 15.7	20 10.2	25 12.7	2 1.0
15～19歳	男性	6 100.0	<b>3</b> <b>50.0</b>	1 16.7	0 0.0	<b>4</b> <b>66.7</b>	0 0.0	0 0.0	<b>1</b> <b>16.7</b>	0 0.0
	女性	4 100.0	<b>3</b> <b>75.0</b>	0 0.0	0 0.0	<b>100.0</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
20～24歳	男性	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	<b>3</b> <b>37.5</b>	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0
	女性	6 100.0	<b>4</b> <b>66.7</b>	1 16.7	1 16.7	<b>3</b> <b>50.0</b>	<b>1</b> <b>16.7</b>	0 0.0	<b>1</b> <b>16.7</b>	0 0.0
25～29歳	男性	6 100.0	1 16.7	<b>3</b> <b>50.0</b>	<b>2</b> <b>33.3</b>	<b>2</b> <b>33.3</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性	12 100.0	<b>8</b> <b>66.7</b>	<b>4</b> <b>33.3</b>	2 16.7	<b>3</b> <b>25.0</b>	<b>3</b> <b>25.0</b>	0 0.0	1 8.3	0 0.0
30～34歳	男性	4 100.0	1 25.0	1 25.0	<b>3</b> <b>75.0</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性	17 100.0	5 29.4	<b>6</b> <b>35.3</b>	0 0.0	<b>4</b> <b>23.5</b>	<b>4</b> <b>23.5</b>	1 5.9	<b>5</b> <b>29.4</b>	0 0.0
35～39歳	男性	6 100.0	2 33.3	<b>4</b> <b>66.7</b>	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	女性	27 100.0	<b>15</b> <b>55.6</b>	2 7.4	3 11.1	<b>10</b> <b>37.0</b>	<b>5</b> <b>18.5</b>	2 7.4	3 11.1	0 0.0
40～44歳	男性	10 100.0	4 40.0	<b>5</b> <b>50.0</b>	<b>8</b> <b>80.0</b>	2 20.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	女性	24 100.0	<b>12</b> <b>50.0</b>	7 29.2	6 25.0	<b>6</b> <b>25.0</b>	<b>9</b> <b>37.5</b>	2 8.3	3 12.5	0 0.0
45～49歳	男性	9 100.0	0 0.0	<b>7</b> <b>77.8</b>	<b>5</b> <b>55.6</b>	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0
	女性	19 100.0	<b>10</b> <b>52.6</b>	<b>6</b> <b>31.6</b>	4 21.1	3 15.8	<b>4</b> <b>21.1</b>	0 0.0	<b>4</b> <b>21.1</b>	0 0.0
50～54歳	男性	8 100.0	1 12.5	<b>5</b> <b>62.5</b>	2 25.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	女性	13 100.0	<b>8</b> <b>61.5</b>	2 15.4	<b>4</b> <b>30.8</b>	2 15.4	1 7.7	1 7.7	1 7.7	0 0.0
55～59歳	男性	15 100.0	7 46.7	<b>8</b> <b>53.3</b>	3 20.0	1 6.7	1 6.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0
	女性	14 100.0	<b>8</b> <b>57.1</b>	2 14.3	3 21.4	3 21.4	1 7.1	2 14.3	1 7.1	0 0.0
60～64歳	男性	10 100.0	4 40.0	1 10.0	<b>4</b> <b>40.0</b>	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性	14 100.0	<b>9</b> <b>64.3</b>	0 0.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	<b>3</b> <b>21.4</b>	2 14.3	0 0.0
65～69歳	男性	8 100.0	1 12.5	<b>4</b> <b>50.0</b>	0 0.0	<b>2</b> <b>25.0</b>	1 12.5	<b>2</b> <b>25.0</b>	0 0.0	0 0.0
	女性	14 100.0	<b>9</b> <b>64.3</b>	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	<b>3</b> <b>21.4</b>	1 7.1	0 0.0
70～74歳	男性	16 100.0	5 31.3	<b>6</b> <b>37.5</b>	<b>5</b> <b>31.3</b>	0 0.0	1 6.3	2 12.5	<b>4</b> <b>25.0</b>	1 6.3
	女性	17 100.0	8 47.1	1 5.9	4 23.5	1 5.9	1 5.9	<b>3</b> <b>17.6</b>	1 5.9	1 5.9
75～79歳	男性	2 100.0	<b>1</b> <b>50.0</b>	<b>1</b> <b>50.0</b>	<b>1</b> <b>50.0</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性	5 100.0	2 40.0	0 0.0	<b>4</b> <b>40.0</b>	2 0.0	0 0.0	<b>1</b> <b>20.0</b>	<b>1</b> <b>20.0</b>	0 0.0
80歳以上	男性	9 100.0	2 22.2	1 11.1	<b>3</b> <b>33.3</b>	0 0.0	0 0.0	<b>3</b> <b>33.3</b>	0 0.0	0 0.0
	女性	10 100.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	<b>2</b> <b>20.0</b>	1 10.0	1 10.0

## 【設問間別特徴】

- 「健康に関すること」の割合をこころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別で見ると、こころの病気を感じたときに、かかりつけ医の医療機関を利用したい人が、全体の割合に比べて高い。

◆表 こころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別◆

	サンプル数	家庭に関すること	勤務に関すること	経済的な問題に関すること	学校に関すること	恋愛や結婚に関すること	健康に関すること	その他	無回答	
全体	319 100.0	140 43.9	84 26.3	70 21.9	57 17.9	36 11.3	34 10.7	33 10.3	3 0.9	
こころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別	かかりつけ医の医療機関 (精神科や心療内科等を除く)	47 100.0	19 40.4	11 23.4	6 12.8	4 8.5	1 2.1	<b>9</b> <b>19.1</b>	4 8.5	0 0.0
	精神科や心療内科等の医療機関	167 100.0	73 43.7	48 28.7	41 24.6	29 17.4	25 15.0	14 8.4	18 10.8	2 1.2
	保健所等の公的機関の相談窓口	8 100.0	<b>4</b> <b>50.0</b>	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	いのちの電話等民間機関の 電話相談窓口	25 100.0	<b>15</b> <b>60.0</b>	4 16.0	<b>10</b> <b>40.0</b>	<b>6</b> <b>24.0</b>	2 8.0	2 8.0	1 4.0	0 0.0
	SNSの相談窓口	11 100.0	7 <b>63.6</b>	2 18.2	1 9.1	<b>4</b> <b>36.4</b>	<b>2</b> <b>18.2</b>	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	<b>3</b> <b>37.5</b>	1 12.5	<b>2</b> <b>25.0</b>	0 0.0	0 0.0
	利用しない	52 100.0	21 40.4	15 28.8	10 19.2	11 21.2	4 7.7	5 9.6	<b>10</b> <b>19.2</b>	1 1.9

## 8 「自殺予防」について


### (45) 自殺を思いとどまった要因

【問 23 で、「2」と回答された方にお聞きします。】

問 23-2. あなたが、自殺を思いとどまった要因は何ですか。(あてはまるものすべてに○)

「家族や友人、同僚などの身近な人に悩みを聞いてもらった」人は3割弱

- 自殺を思いとどまった原因について、「家族や友人、同僚などの身近な人に悩みを聞いてもらった」が28.5%で最も高い。
- その他の内訳について、「母や子どものため」といった意見がみられた。



#### 【属性別特徴】

- 「家族や友人、同僚などの身近な人に悩みを聞いてもらった」の割合を性別・年代別でみると、男性・15～19歳、男性・40～44歳、男性・60～64歳、女性・15～19歳、女性・30～39歳、女性・60～64歳、女性・75歳以上が、全体の割合に比べて高い。



◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	な家族や友人、同僚などの身近な人に悩みを聞いてもらった	趣味や仕事など他のことでの気分を紛らわせるようにした	特に何もしなかった	できるだけ休養をとるようにした	自殺しようと思った原因が解決した	医師やカウンセラーなどの心の健康に関する専門家に相談した	分野の専門家と相談した	弁護士や司法書士、公的機関の相談員など悩みの元となる	自殺対策のチラシやポスターを見た	その他	無回答
全体		291	83	70	52	45	30	29	2	0	31	54	
		100.0	28.5	24.1	17.9	15.5	10.3	10.0	0.7	0.0	10.7	18.6	
性別	男性	110	26	31	22	20	10	13	1	0	9	21	
		100.0	23.6	28.2	20.0	18.2	9.1	11.8	0.9	0.0	8.2	19.1	
	女性	177	56	39	29	25	20	16	1	0	22	31	
		100.0	31.6	22.0	16.4	14.1	11.3	9.0	0.6	0.0	12.4	17.5	
15～19歳	男性	5	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	
		100.0	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
	女性	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
		100.0	50.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20～24歳	男性	7	1	2	4	0	1	0	0	0	0	0	
		100.0	14.3	28.6	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	女性	6	2	1	0	1	1	1	0	0	1	2	
		100.0	33.3	16.7	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	16.7	33.3	
25～29歳	男性	5	0	1	2	1	0	0	0	0	1	1	
		100.0	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
	女性	11	2	1	3	2	3	1	0	0	2	1	
		100.0	18.2	9.1	27.3	18.2	27.3	9.1	0.0	0.0	18.2	9.1	
30～34歳	男性	4	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	
		100.0	25.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	
	女性	14	5	2	2	2	0	1	0	0	4	3	
		100.0	35.7	14.3	14.3	14.3	0.0	7.1	0.0	0.0	28.6	21.4	
35～39歳	男性	6	2	1	2	3	0	1	0	0	0	1	
		100.0	33.3	16.7	33.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	
	女性	25	9	5	4	5	4	5	0	0	4	2	
		100.0	36.0	20.0	16.0	20.0	16.0	20.0	0.0	0.0	16.0	8.0	
40～44歳	男性	10	4	4	2	2	1	3	0	0	1	1	
		100.0	40.0	40.0	20.0	20.0	10.0	30.0	0.0	0.0	10.0	10.0	
	女性	21	6	7	3	5	2	1	0	0	4	5	
		100.0	28.6	33.3	14.3	23.8	9.5	4.8	0.0	0.0	4.8	23.8	
45～49歳	男性	9	3	2	1	1	0	3	1	0	2	1	
		100.0	33.3	22.2	11.1	11.1	0.0	33.3	11.1	0.0	22.2	11.1	
	女性	17	3	5	2	4	1	1	1	0	3	2	
		100.0	17.6	29.4	11.8	23.5	5.9	5.9	5.9	0.0	17.6	11.8	
50～54歳	男性	8	1	2	1	3	2	2	0	0	0	1	
		100.0	12.5	25.0	12.5	37.5	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	
	女性	9	2	3	2	2	3	1	0	0	0	0	
		100.0	22.2	33.3	22.2	22.2	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
55～59歳	男性	14	4	5	0	3	0	2	0	0	1	4	
		100.0	28.6	35.7	0.0	21.4	0.0	14.3	0.0	0.0	7.1	28.6	
	女性	13	1	2	3	1	2	1	0	0	1	3	
		100.0	7.7	15.4	23.1	7.7	15.4	7.7	0.0	0.0	7.7	23.1	
60～64歳	男性	8	3	1	0	1	1	0	0	0	0	3	
		100.0	37.5	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	
	女性	12	8	1	1	0	1	1	0	0	3	2	
		100.0	66.7	8.3	8.3	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0	25.0	16.7	
65～69歳	男性	8	2	3	0	1	0	1	0	0	1	2	
		100.0	25.0	37.5	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5	25.0	
	女性	13	4	2	2	0	1	0	0	0	0	4	
		100.0	30.8	15.4	15.4	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	
70～74歳	男性	14	2	4	5	2	3	1	0	0	2	2	
		100.0	14.3	28.6	35.7	14.3	21.4	7.1	0.0	0.0	14.3	14.3	
	女性	16	3	5	3	2	1	1	0	0	3	4	
		100.0	18.8	31.3	18.8	12.5	6.3	6.3	0.0	0.0	18.8	25.0	
75～79歳	男性	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	女性	5	4	1	0	0	1	1	0	0	0	1	
		100.0	80.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
80歳以上	男性	9	1	3	2	0	1	0	0	0	0	2	
		100.0	11.1	33.3	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	
	女性	10	4	3	2	0	0	0	0	0	0	2	
		100.0	40.0	30.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	

## 8 「自殺予防」について

### 【設問間別特徴】

- 「趣味や仕事など他のことで気を紛らわせるようにした」の割合をこころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別でみると、こころの病気を感じたときに、かかりつけ医の医療機関を利用したい人が、全体の割合に比べて高い。

◆表 こころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別◆


	サンプル数	家族や友人、同僚などの身近な人に悩みを聞いてもらった	趣味や仕事など他のことで気を紛らわせるようにした	特に何もしなかった	できるだけ休養をとるようにした	自殺しようと思った原因が解決しなかった	医師やカウンセラーなどの相談にのった	分野の専門家に相談した	弁護士や司法書士、公的機関の相談員など悩みの元となる	自殺対策のチラシやポスターを見た	その他	無回答
全体	291	83	70	52	45	30	29	2	0	31	54	
	100.0	28.5	24.1	17.9	15.5	10.3	10.0	0.7	0.0	10.7	18.6	
こころの病気を感じたときに利用したい専門窓口別	かかりつけ医の医療機関 (精神科や心療内科等を除く)	43	11	14	7	6	2	2	0	0	0	10
		100.0	25.6	32.6	16.3	14.0	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	23.3
	精神科や心療内科等の医療機関	156	51	40	22	31	22	25	1	0	19	24
		100.0	32.7	25.6	14.1	19.9	14.1	16.0	0.6	0.0	12.2	15.4
	保健所等の公的機関の相談窓口	7	3	1	0	2	0	1	0	0	0	4
		100.0	42.9	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	57.1
	いのちの電話等民間機関の 電話相談窓口	23	8	7	5	4	0	1	0	0	1	4
		100.0	34.8	30.4	21.7	17.4	0.0	4.3	0.0	0.0	4.3	17.4
SNSの相談窓口	9	3	0	2	0	1	0	0	0	1	2	
	100.0	33.3	0.0	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	22.2	
その他	8	3	2	0	0	1	0	1	0	1	2	
	100.0	37.5	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5	25.0	
利用しない	44	4	6	16	2	4	0	0	0	9	7	
	100.0	9.1	13.6	36.4	4.5	9.1	0.0	0.0	0.0	20.5	15.9	

## (46) 「ゲートキーパー」の認知状況

問 24. あなたは、「ゲートキーパー」について知っていますか。(○はひとつ)

ゲートキーパーの名称も内容も知らない人は7割強

- 「ゲートキーパー」の認知度について、「名称を聞いたことはなく、何かよくわからない」が70.7%で最も高い。



## 【属性別特徴】

- 「名称を聞いたことはなく、何かよくわからない」の割合を性別・年代別で見ると、男性・45～49歳、男性・60～64歳、女性・40～44歳、女性・65～69歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「名称を聞いたことはなく、何かよくわからない」の割合をブロック別で見ると、東部A、北部A、南西部が、全体の割合に比べて高い。

## 8 「自殺予防」について

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	ゲートキーパー研修を受けたことがあり、知っている	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思う	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思うが、知らない	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思うが、知らない	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思うが、知らない	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思うが、知らない	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思うが、知らない	研修を受けたことがあり、研修を聞いたと思うが、知らない	無回答
全体		1,275 100.0	20 1.6	26 2.0	99 7.8	71 5.6	80 6.3	901 70.7	78 6.1		
性別	男性	491 100.0	10 2.0	9 1.8	43 8.8	24 4.9	33 6.7	346 70.5	26 5.3		
	女性	766 100.0	10 1.3	16 2.1	53 6.9	45 5.9	46 6.0	548 71.5	48 6.3		
15～19歳	男性	21 100.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8	1 0.0	18 85.7	0 0.0		
	女性	27 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.7	1 3.7	1 3.7	23 85.2	1 3.7		
20～24歳	男性	18 100.0	0 0.0	1 5.6	5 27.8	0 0.0	1 5.6	11 61.1	0 0.0		
	女性	24 100.0	0 0.0	2 8.3	3 12.5	1 4.2	0 0.0	18 75.0	0 0.0		
25～29歳	男性	17 100.0	2 11.8	0 0.0	3 17.6	1 5.9	0 0.0	11 64.7	0 0.0		
	女性	28 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.6	1 3.6	0 0.0	26 92.9	0 0.0		
30～34歳	男性	19 100.0	1 5.3	1 5.3	0 0.0	0 0.0	2 10.5	15 78.9	0 0.0		
	女性	38 100.0	1 2.6	1 2.6	4 10.5	2 5.3	3 7.9	27 71.1	0 0.0		
35～39歳	男性	33 100.0	1 3.0	0 0.0	4 12.1	3 9.1	2 6.1	22 66.7	1 3.0		
	女性	59 100.0	1 1.7	2 3.4	5 8.5	5 8.5	2 3.4	43 72.9	1 1.7		
40～44歳	男性	32 100.0	1 3.1	2 6.3	2 6.3	1 3.1	2 6.3	24 75.0	0 0.0		
	女性	71 100.0	1 1.4	3 4.2	3 4.2	4 5.6	4 5.6	55 77.5	1 1.4		
45～49歳	男性	43 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	2 4.7	3 7.0	35 81.4	2 4.7		
	女性	61 100.0	0 0.0	2 3.3	6 9.8	5 8.2	8 13.1	40 65.6	0 0.0		
50～54歳	男性	40 100.0	0 0.0	0 0.0	3 7.5	3 7.5	4 10.0	29 72.5	1 2.5		
	女性	50 100.0	0 0.0	3 6.0	6 12.0	3 6.0	5 10.0	33 66.0	0 0.0		
55～59歳	男性	35 100.0	1 2.9	2 5.7	3 8.6	2 5.7	3 8.6	22 62.9	2 5.7		
	女性	63 100.0	1 1.6	2 3.2	6 9.5	6 9.5	6 9.5	39 61.9	3 4.8		
60～64歳	男性	56 100.0	1 1.8	0 0.0	5 8.9	3 5.4	1 1.8	43 76.8	3 5.4		
	女性	65 100.0	1 1.5	0 0.0	7 10.8	7 10.8	2 3.1	48 73.8	0 0.0		
65～69歳	男性	46 100.0	2 4.3	1 2.2	2 4.3	1 2.2	3 6.5	33 71.7	4 8.7		
	女性	75 100.0	1 1.3	1 1.3	4 5.3	3 4.0	4 5.3	58 77.3	4 5.3		
70～74歳	男性	61 100.0	0 0.0	1 1.6	8 13.1	1 1.6	4 6.6	42 68.9	5 8.2		
	女性	87 100.0	3 3.4	0 0.0	4 4.6	2 2.3	9 10.3	61 70.1	8 9.2		
75～79歳	男性	29 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.4	4 13.8	4 13.8	17 58.6	3 10.3		
	女性	53 100.0	1 1.9	0 0.0	2 3.8	2 3.8	1 1.9	32 60.4	15 28.3		
80歳以上	男性	36 100.0	1 2.8	1 2.8	2 5.6	2 5.6	4 11.1	21 58.3	5 13.9		
	女性	62 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	3 4.8	1 1.6	42 67.7	15 24.2		

◆表 ブロック別◆

	サンプル数	ゲートキーパー研修を受けたことがあり、知っている	研修を受けたと思う	名称を聞いたことがあるが、思わない	研修を受けたと思う	名称を聞いたことがないが、研修を受けたと思う	研修を受けたと思う	研修を受けたと思う	研修を受けたと思う	研修を受けたと思う	研修を受けたと思う	研修を受けたと思う	無回答
全 体	1,275 100.0	20 1.6	26 2.0	99 7.8	71 5.6	80 6.3	901 70.7	78 6.1					
ブロック別	東部A	91 100.0	0 0.0	1 1.1	8 8.8	4 4.4	71 78.0	3 3.3					
	東部B	80 100.0	0 0.0	1 1.3	2 2.5	6 7.5	4 5.0	57 71.3	10 12.5				
	北部A	113 100.0	1 0.9	2 1.8	7 6.2	4 3.5	5 4.4	88 77.9	6 5.3				
	北部B	72 100.0	1 1.4	2 2.8	6 8.3	3 4.2	9 12.5	47 65.3	4 5.6				
	中央東部	140 100.0	4 2.9	4 2.9	9 6.4	6 4.3	6 4.3	105 75.0	6 4.3				
	南東部	108 100.0	1 0.9	2 1.9	16 14.8	4 3.7	6 5.6	73 67.6	6 5.6				
	中央部	177 100.0	2 1.1	4 2.3	14 7.9	15 8.5	17 9.6	117 66.1	8 4.5				
	中央南部	205 100.0	9 4.4	5 2.4	16 7.8	13 6.3	14 6.8	138 67.3	10 4.9				
	南西部	125 100.0	1 0.8	0 0.0	8 6.4	7 5.6	5 4.0	95 76.0	9 7.2				
	西部A	55 100.0	1 1.8	2 3.6	2 3.6	2 3.6	5 9.1	36 65.5	7 12.7				
	西部B	74 100.0	0 0.0	1 1.4	5 6.8	5 6.8	3 4.1	55 74.3	5 6.8				


## 9 「防災」について

### (47) ハザードマップの認知状況

問 25. あなたは、久留米市が作成している大雨による浸水や土砂崩れ等の恐れがある場所を示したハザードマップを知っていますか。(〇はひとつ)

ハザードマップを「知っている」人は8割強

- ハザードマップの認知状況について、「知っており、自宅付近などを確認した」が50.9%で最も高い。



#### 【属性別特徴】

- 「知っており、自宅付近などを確認した」の割合を性別・年代別で見ると、男性・40～54歳、男性・65～69歳、女性・30～59歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「知っており、自宅付近などを確認した」の割合をブロック別で見ると、北部A・Bが、全体の割合に比べて高い。

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	知っているが、 自宅付近な どを確認した	知っているが、 見たこと がない	知っているが、 見方が 分からない	知らない	無回答
全体		1,275 100.0	649 50.9	338 26.5	85 6.7	154 12.1	49 3.8
性別	男性	491 100.0	257 52.3	135 27.5	26 5.3	60 12.2	13 2.6
	女性	766 100.0	385 50.3	199 26.0	59 7.7	92 12.0	31 4.0
15~19歳	男性	21 100.0	6 28.6	7 33.3	4 19.0	4 19.0	0 0.0
	女性	27 100.0	7 25.9	14 51.9	2 7.4	4 14.8	0 0.0
20~24歳	男性	18 100.0	8 44.4	7 38.9	2 11.1	1 5.6	0 0.0
	女性	24 100.0	11 45.8	7 29.2	2 8.3	4 16.7	0 0.0
25~29歳	男性	17 100.0	8 47.1	6 35.3	1 5.9	2 11.8	0 0.0
	女性	28 100.0	11 39.3	7 25.0	2 7.1	8 28.6	0 0.0
30~34歳	男性	19 100.0	11 57.9	4 21.1	1 5.3	3 15.8	0 0.0
	女性	38 100.0	23 60.5	11 28.9	1 2.6	3 7.9	0 0.0
35~39歳	男性	33 100.0	15 45.5	12 36.4	3 9.1	3 9.1	0 0.0
	女性	59 100.0	33 55.9	12 20.3	5 8.5	9 15.3	0 0.0
40~44歳	男性	32 100.0	18 56.3	7 21.9	2 6.3	5 15.6	0 0.0
	女性	71 100.0	43 60.6	19 26.8	3 4.2	6 8.5	0 0.0
45~49歳	男性	43 100.0	28 65.1	9 20.9	2 4.7	4 9.3	0 0.0
	女性	61 100.0	40 65.6	13 21.3	3 4.9	5 8.2	0 0.0
50~54歳	男性	40 100.0	23 57.5	9 22.5	2 5.0	6 15.0	0 0.0
	女性	50 100.0	29 58.0	13 26.0	3 6.0	5 10.0	0 0.0
55~59歳	男性	35 100.0	19 54.3	12 34.3	0 0.0	3 8.6	1 2.9
	女性	63 100.0	41 65.1	17 27.0	3 4.8	0 0.0	2 3.2
60~64歳	男性	56 100.0	29 51.8	19 33.9	1 1.8	6 10.7	1 1.8
	女性	65 100.0	33 50.8	19 29.2	7 10.8	5 7.7	1 1.5
65~69歳	男性	46 100.0	31 67.4	7 15.2	0 0.0	5 10.9	3 6.5
	女性	75 100.0	35 46.7	19 25.3	9 12.0	10 13.3	2 2.7
70~74歳	男性	61 100.0	32 52.5	16 26.2	2 3.3	8 13.1	3 4.9
	女性	87 100.0	37 42.5	26 29.9	6 6.9	14 16.1	4 4.6
75~79歳	男性	29 100.0	15 51.7	8 27.6	2 6.9	3 10.3	1 3.4
	女性	53 100.0	21 39.6	11 20.8	7 13.2	5 9.4	9 17.0
80歳以上	男性	36 100.0	12 33.3	11 30.6	4 11.1	6 16.7	3 8.3
	女性	62 100.0	18 29.0	11 17.7	6 9.7	14 22.6	13 21.0

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	知っているが、 自宅付近な どを確認した	知っているが、 見たこと がない	知っているが、 見方が 分からない	知らない	無回答
全体		1,275 100.0	649 50.9	338 26.5	85 6.7	154 12.1	49 3.8
ブロック別	東部A	91 100.0	46 50.5	20 22.0	6 6.6	16 17.6	3 3.3
	東部B	80 100.0	40 50.0	23 28.8	4 5.0	8 10.0	5 6.3
	北部A	113 100.0	66 58.4	28 24.8	10 8.8	7 6.2	2 1.8
	北部B	72 100.0	41 56.9	15 20.8	5 6.9	10 13.9	1 1.4
	中央東部	140 100.0	73 52.1	34 24.3	6 4.3	24 17.1	3 2.1
	南東部	108 100.0	51 47.2	33 30.6	8 7.4	11 10.2	5 4.6
	中央部	177 100.0	92 52.0	47 26.6	13 7.3	18 10.2	7 4.0
	中央南部	205 100.0	107 52.2	58 28.3	14 6.8	21 10.2	5 2.4
	南西部	125 100.0	59 47.2	32 25.6	8 6.4	17 13.6	9 7.2
	西部A	55 100.0	18 32.7	21 38.2	2 3.6	10 18.2	4 7.3
	西部B	74 100.0	40 54.1	19 25.7	6 8.1	6 8.1	3 4.1

## 9 「防災」について


### (48) 災害による危険が高まった場合に自分又は家族がとる行動

問 26. あなたは、災害による危険が高まった場合、自分又は家族が取るべき行動を決めていますか。

(○はひとつ)

「自宅は被災の可能性がないため、在宅で避難する」人は4割弱

- 災害による危険が高まった場合に自分又は家族がとる行動について、「自宅は被災の可能性がないため、在宅で避難する」が36.2%で最も高く、「市の指定避難所」が33.0%と続く。



#### 【属性別特徴】

- 「自宅は被災の可能性がないため、在宅で避難する(2階以上の高所に避難する垂直避難を含む)」の割合を性別・年代別で見ると、男性・40～44歳、男性・50～54歳、男性・70～74歳、女性・35～39歳、女性・50～54歳、女性・60～64歳、女性・70～74歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「市の指定避難所(コミュニティセンターや学校等)に避難する」の割合を性別・年代別で見ると、女性・30～34歳が全体の割合に比べて高い。
- 「自宅は被災の可能性がないため、在宅で避難する(2階以上の高所に避難する垂直避難を含む)」の割合をブロック別で見ると、中央部が全体の割合に比べて高い。
- 「市の指定避難所(コミュニティセンターや学校等)に避難する」の割合をブロック別で見ると、南東部、西部Aが全体の割合に比べて高い。



◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	避難する 市指定避難所 (コミュニティや学校等)に	安全な親戚又は知人宅に 避難する	直階以上の高所に 避難する(含む)	自宅は被災の可能性がない ため、在宅で避難する(含む)	決めていない	無回答
全体		1,275 100.0	421 33.0	126 9.9	462 36.2	223 17.5	43 3.4	
性別	男性	491 100.0	163 33.2	46 9.4	175 35.6	93 18.9	14 2.9	
	女性	766 100.0	255 33.3	78 10.2	282 36.8	127 16.6	24 3.1	
15~19歳	男性	21 100.0	5 23.8	5 23.8	8 38.1	3 14.3	0 0.0	
	女性	27 100.0	16 59.3	4 14.8	2 7.4	5 18.5	0 0.0	
20~24歳	男性	18 100.0	7 38.9	0 0.0	4 22.2	7 38.9	0 0.0	
	女性	24 100.0	10 41.7	2 8.3	7 29.2	5 20.8	0 0.0	
25~29歳	男性	17 100.0	9 52.9	4 23.5	2 11.8	2 11.8	0 0.0	
	女性	28 100.0	13 46.4	1 3.6	4 14.3	10 35.7	0 0.0	
30~34歳	男性	19 100.0	7 36.8	2 10.5	3 15.8	7 36.8	0 0.0	
	女性	38 100.0	15 39.5	4 10.5	12 31.6	7 18.4	0 0.0	
35~39歳	男性	33 100.0	11 33.3	7 21.2	9 27.3	6 18.2	0 0.0	
	女性	59 100.0	19 32.2	5 8.5	26 44.1	9 15.3	0 0.0	
40~44歳	男性	32 100.0	10 31.3	1 3.1	15 46.9	6 18.8	0 0.0	
	女性	71 100.0	16 22.5	12 16.9	29 40.8	14 19.7	0 0.0	
45~49歳	男性	43 100.0	14 32.6	4 9.3	14 32.6	11 25.6	0 0.0	
	女性	61 100.0	21 34.4	6 9.8	23 37.7	11 18.0	0 0.0	
50~54歳	男性	40 100.0	15 37.5	1 2.5	17 42.5	7 17.5	0 0.0	
	女性	50 100.0	15 30.0	3 6.0	22 44.0	10 20.0	0 0.0	
55~59歳	男性	35 100.0	13 37.1	2 5.7	11 31.4	8 22.9	1 2.9	
	女性	63 100.0	23 36.5	2 3.2	25 39.7	12 19.0	1 1.6	
60~64歳	男性	56 100.0	19 33.9	8 14.3	21 37.5	6 10.7	2 3.6	
	女性	65 100.0	20 30.8	11 16.9	28 43.1	5 7.7	1 1.5	
65~69歳	男性	46 100.0	17 37.0	2 4.3	14 30.4	9 19.6	4 8.7	
	女性	75 100.0	22 29.3	9 12.0	29 38.7	14 18.7	1 1.3	
70~74歳	男性	61 100.0	15 24.6	2 3.3	32 52.5	9 14.8	3 4.9	
	女性	87 100.0	27 31.0	10 11.5	37 42.5	9 10.3	4 4.6	
75~79歳	男性	29 100.0	7 24.1	4 13.8	15 51.7	2 6.9	1 3.4	
	女性	53 100.0	17 32.1	3 5.7	21 39.6	5 9.4	7 13.2	
80歳以上	男性	36 100.0	12 33.3	4 11.1	8 22.2	9 25.0	3 8.3	
	女性	62 100.0	21 33.9	5 8.1	15 24.2	11 17.7	10 16.1	

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	避難する 市指定避難所 (コミュニティや学校等)に	安全な親戚又は知人宅に 避難する	直階以上の高所に 避難する(含む)	自宅は被災の可能性がない ため、在宅で避難する(含む)	決めていない	無回答
全体		1,275 100.0	421 33.0	126 9.9	462 36.2	223 17.5	43 3.4	
ブロック別	東部A	91 100.0	26 28.6	15 16.5	34 37.4	13 14.3	3 3.3	
	東部B	80 100.0	18 22.5	9 11.3	32 40.0	15 18.8	6 7.5	
	北部A	113 100.0	41 36.3	14 12.4	40 35.4	16 14.2	2 1.8	
	北部B	72 100.0	25 34.7	8 11.1	23 31.9	15 20.8	1 1.4	
	中央東部	140 100.0	53 37.9	7 5.0	56 40.0	22 15.7	2 1.4	
	南東部	108 100.0	46 42.6	4 3.7	33 30.6	23 21.3	2 1.9	
	中央部	177 100.0	50 28.2	17 9.6	73 41.2	31 17.5	6 3.4	
	中央南部	205 100.0	69 33.7	16 7.8	80 39.0	33 16.1	7 3.4	
	南西部	125 100.0	36 28.8	15 12.0	44 35.2	24 19.2	6 4.8	
	西部A	55 100.0	22 40.0	8 14.5	11 20.0	12 21.8	2 3.6	
	西部B	74 100.0	27 36.5	9 12.2	25 33.8	11 14.9	2 2.7	

## 9 「防災」について

### 【設問間別特徴】

- 「自宅は被災の可能性がないため、在宅で避難する（2階以上の高所に避難する垂直避難を含む）」の割合を住居形態別で見ると、持ち家（集合住宅・分譲マンション）が全体の割合に比べて高い。
- 「市の指定避難所（コミュニティセンターや学校等）に避難する」の割合を住居形態別で見ると、借家住宅（一戸建て）が、全体の割合に比べて高い。

◆表 住居形態別◆


		サ ン プ ル 数	避 難 す る 市 の 指 定 避 難 所 （ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー や 学 校 等 ） に ニ	安 全 な 親 戚 又 は 知 人 宅 に	直 階 以 上 の 高 所 に 避 難 す る （ 垂 直 避 難 を 含 む ）	自 宅 は 被 災 の 可 能 性 が な い （ 2 階 以 上 の 高 所 に 避 難 す る ）	決 め て い な い	無 回 答
全 体		1,275 100.0	421 33.0	126 9.9	462 36.2	223 17.5	43 3.4	
住 居 形 態 別	持ち家（一戸建て）	817 100.0	284 34.8	81 9.9	285 34.9	140 17.1	27 3.3	
	持ち家 （集合住宅・分譲マンション）	129 100.0	28 21.7	4 3.1	<b>76</b> <b>58.9</b>	19 14.7	2 1.6	
	借家住宅（一戸建て）	45 100.0	<b>18</b> <b>40.0</b>	<b>8</b> <b>17.8</b>	7 15.6	10 22.2	2 4.4	
	賃貸住宅 （アパート、マンション）	232 100.0	77 33.2	28 12.1	78 33.6	40 17.2	9 3.9	
	勤務先給与住宅 （公務員住宅・社宅・寮など）	15 100.0	<b>8</b> <b>53.3</b>	1 6.7	3 20.0	3 20.0	0 0.0	

## (49) 避難情報の取得媒体

問 27. あなたは、避難情報（高齢者等避難、避難指示等）をどのように取得していますか。（あてはまるものすべてに○）

避難情報を「緊急速報メール」で取得する人は8割弱

- 避難情報の取得媒体について、「緊急速報メール」が77.9%で最も高く、「ラジオ、テレビ」が73.1%と続く。



## 【属性別特徴】

- 「緊急速報メール」の割合を性別・年代別で見ると、男性・40～44歳、男性・50～64歳、女性・35～39歳、女性・45～69歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「テレビ・ラジオ」の割合を性別・年代別で見ると、男性・65～74歳、女性・30～34歳、女性・50～59歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「テレビ・ラジオ」の割合をブロック別で見ると、西部Aが全体の割合に比べて高い。

## 9 「防災」について

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	緊急速報メール	テレビ、ラジオ	F a c e b o o k	市のSNS（LINE、	市のホームページ	消防団車両による広報	市の避難情報配信サービス	福岡県防災メールまもるくん	自主防災組織、近隣住民による声掛け	市の緊急告知防災ラジオ	避難情報は知らない	無回答
全体		1,275 100.0	993 77.9	932 73.1	224 17.6	154 12.1	144 11.3	115 9.0	93 7.3	63 4.9	44 3.5	16 1.3	39 3.1	
性別	男性	491 100.0	382 77.8	361 73.5	82 16.7	71 14.5	71 14.5	47 9.6	30 6.1	27 5.5	18 3.7	7 1.4	14 2.9	
	女性	766 100.0	599 78.2	560 73.1	138 18.0	82 10.7	72 9.4	68 8.9	62 8.1	36 4.7	25 3.3	8 1.0	22 2.9	
15～19歳	男性	21 100.0	19 90.5	14 66.7	1 4.8	4 19.0	2 9.5	2 9.5	2 9.5	2 9.5	1 4.8	0 0.0	0 0.0	
	女性	27 100.0	19 70.4	17 63.0	2 7.4	2 7.4	0 0.0	0 0.0	0 3.7	1 3.7	1 3.7	1 3.7	0 0.0	
20～24歳	男性	18 100.0	14 77.8	10 55.6	2 11.1	3 16.7	2 11.1	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	
	女性	24 100.0	21 87.5	16 66.7	8 33.3	3 12.5	1 4.2	2 8.3	0 0.0	1 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
25～29歳	男性	17 100.0	14 82.4	11 64.7	5 29.4	8 47.1	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	
	女性	28 100.0	23 82.1	15 53.6	4 14.3	3 10.7	1 3.6	0 0.0	2 7.1	2 7.1	0 0.0	1 3.6	0 0.0	
30～34歳	男性	19 100.0	14 73.7	17 89.5	5 26.3	3 15.8	1 5.3	1 5.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	
	女性	38 100.0	30 78.9	30 78.9	10 26.3	9 23.7	0 0.0	3 7.9	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
35～39歳	男性	33 100.0	27 81.8	24 72.7	9 27.3	5 15.2	1 3.0	1 3.0	1 3.0	0 0.0	1 3.0	2 6.1	0 0.0	
	女性	59 100.0	49 83.1	44 74.6	22 37.3	7 11.9	2 3.4	4 6.8	7 11.9	0 0.0	0 0.0	1 1.7	0 0.0	
40～44歳	男性	32 100.0	30 93.8	22 68.8	5 15.6	4 12.5	4 12.5	1 3.1	5 15.6	0 0.0	1 3.1	1 3.1	0 0.0	
	女性	71 100.0	58 81.7	49 69.0	21 29.6	12 16.9	4 5.6	4 5.6	10 14.1	2 2.8	2 2.8	0 0.0	0 0.0	
45～49歳	男性	43 100.0	34 79.1	30 69.8	11 25.6	7 16.3	3 7.0	2 4.7	1 2.3	2 4.7	1 2.3	1 2.3	0 0.0	
	女性	61 100.0	54 88.5	40 65.6	12 19.7	9 14.8	3 4.9	5 8.2	10 16.4	2 3.3	2 3.3	2 3.3	0 0.0	
50～54歳	男性	40 100.0	36 90.0	31 77.5	8 20.0	10 25.0	6 15.0	4 10.0	3 7.5	5 12.5	1 2.5	0 0.0	0 0.0	
	女性	50 100.0	45 90.0	44 88.0	15 30.0	7 14.0	7 14.0	4 8.0	6 12.0	3 6.0	2 4.0	0 0.0	0 0.0	
55～59歳	男性	35 100.0	29 82.9	22 62.9	10 28.6	3 8.6	3 8.6	4 11.4	4 11.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9	
	女性	63 100.0	53 84.1	55 87.3	14 22.2	9 14.3	7 11.1	4 6.3	4 6.3	2 3.2	1 1.6	0 0.0	1 1.6	
60～64歳	男性	56 100.0	47 83.9	41 73.2	10 17.9	6 10.7	6 10.7	4 7.1	1 1.8	2 3.6	2 3.6	0 0.0	2 3.6	
	女性	65 100.0	61 93.8	48 73.8	12 18.5	5 7.7	5 7.7	7 10.8	6 9.2	3 4.6	1 1.5	0 0.0	0 0.0	
65～69歳	男性	46 100.0	34 73.9	36 78.3	6 13.0	5 10.9	8 17.4	6 13.0	5 10.9	3 6.5	3 6.5	0 0.0	3 6.5	
	女性	75 100.0	65 86.7	56 74.7	7 9.3	1 1.3	12 16.0	11 14.7	3 4.0	6 8.0	2 2.7	1 1.3	2 2.7	
70～74歳	男性	61 100.0	42 68.9	48 78.7	6 9.8	6 9.8	17 27.9	8 13.1	1 1.6	4 6.6	2 3.3	1 1.6	3 4.9	
	女性	87 100.0	64 73.6	61 70.1	7 8.0	4 4.6	15 17.2	12 13.8	4 4.6	6 6.9	5 5.7	0 0.0	4 4.6	
75～79歳	男性	29 100.0	19 65.5	24 82.8	3 10.3	2 6.9	11 37.9	6 20.7	1 3.4	3 10.3	1 3.4	0 0.0	1 3.4	
	女性	53 100.0	31 58.5	39 73.6	0 0.0	4 7.5	8 15.1	6 11.3	3 5.7	2 3.8	2 3.8	0 0.0	6 11.3	
80歳以上	男性	36 100.0	20 55.6	28 77.8	1 2.8	4 11.1	6 16.7	6 16.7	1 2.8	4 11.1	3 8.3	0 0.0	4 11.1	
	女性	62 100.0	24 38.7	44 71.0	2 3.2	0 0.0	7 11.3	6 9.7	4 6.5	6 9.7	7 11.3	2 3.2	9 14.5	

◆表 ブロック別◆

	サンプル数	緊急速報メール	テレビ、ラジオ	市のSNS（LINE、Facebook）	市のホームページ	消防団車両による広報	市の避難情報配信サービス	福岡県防災メールまもるくん	自主防災組織、近隣住民による声掛け	市の緊急告知防災ラジオ	避難情報は知らない	無回答	
全 体	1,275 100.0	993 77.9	932 73.1	224 17.6	154 12.1	144 11.3	115 9.0	93 7.3	63 4.9	44 3.5	16 1.3	39 3.1	
ブロック別	東部A	91 100.0	73 80.2	63 69.2	14 15.4	4 4.4	16 17.6	7 7.7	4 4.4	9 9.9	2 2.2	1 1.1	3 3.3
	東部B	80 100.0	55 68.8	57 71.3	10 12.5	8 10.0	17 21.3	9 11.3	5 6.3	9 11.3	6 7.5	0 0.0	7 8.8
	北部A	113 100.0	89 78.8	86 76.1	21 18.6	15 13.3	12 10.6	15 13.3	7 6.2	10 8.8	4 3.5	2 1.8	1 0.9
	北部B	72 100.0	54 75.0	56 77.8	14 19.4	9 12.5	4 5.6	5 6.9	5 6.9	4 5.6	1 1.4	1 1.4	0 0.0
	中央東部	140 100.0	110 78.6	101 72.1	28 20.0	18 12.9	13 9.3	8 5.7	13 9.3	3 2.1	4 2.9	3 2.1	2 1.4
	南東部	108 100.0	84 77.8	82 75.9	13 12.0	9 8.3	13 12.0	8 7.4	6 5.6	6 5.6	4 3.7	0 0.0	4 3.7
	中央部	177 100.0	140 79.1	133 75.1	32 18.1	25 14.1	17 9.6	12 6.8	18 10.2	1 0.6	3 1.7	4 2.3	4 2.3
	中央南部	205 100.0	165 80.5	140 68.3	42 20.5	35 17.1	14 6.8	25 12.2	19 9.3	7 3.4	7 3.4	3 1.5	7 3.4
	南西部	125 100.0	97 77.6	95 76.0	21 16.8	11 8.8	12 9.6	10 8.0	10 8.0	3 2.4	5 4.0	1 0.8	5 4.0
	西部A	55 100.0	39 70.9	44 80.0	10 18.2	7 12.7	16 29.1	5 9.1	1 1.8	5 9.1	6 10.9	0 0.0	2 3.6
	西部B	74 100.0	61 82.4	52 70.3	11 14.9	9 12.2	9 12.2	9 12.2	4 5.4	6 8.1	0 0.0	0 0.0	1 1.4


## 9 「防災」について

### (50) 「避難行動要支援者名簿」の認知状況

問 28. あなたは、「避難行動要支援者名簿」について知っていますか。(○はひとつ)

8割強の人は「避難行動要支援者名簿」を知らない

- 「避難行動要支援者名簿」の認知状況について、「知らない」が81.3%で最も高い。



#### 【属性別特徴】

- 「知っている」の割合を性別・年代別で見ると、男性・55～59歳、男性・65～74歳、男性・80歳以上、女性・55～59歳、女性・65～74歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「知っている」の割合をブロック別で見ると、東部Aが全体の割合に比べて高い。

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	知っている	知らない	無回答
全体		1,275 100.0	183 14.4	1,037 81.3	55 4.3
性別	男性	491 100.0	74 15.1	401 81.7	16 3.3
	女性	766 100.0	108 14.1	623 81.3	35 4.6
15～19歳	男性	21 100.0	1 4.8	<b>20</b> <b>95.2</b>	0 0.0
	女性	27 100.0	0 0.0	<b>27</b> <b>100.0</b>	0 0.0
20～24歳	男性	18 100.0	0 0.0	<b>18</b> <b>100.0</b>	0 0.0
	女性	24 100.0	3 12.5	<b>21</b> <b>87.5</b>	0 0.0
25～29歳	男性	17 100.0	2 11.8	<b>15</b> <b>88.2</b>	0 0.0
	女性	28 100.0	1 3.6	<b>27</b> <b>96.4</b>	0 0.0
30～34歳	男性	19 100.0	1 5.3	<b>18</b> <b>94.7</b>	0 0.0
	女性	38 100.0	2 5.3	<b>36</b> <b>94.7</b>	0 0.0
35～39歳	男性	33 100.0	5 15.2	28 84.8	0 0.0
	女性	59 100.0	6 10.2	<b>53</b> <b>89.8</b>	0 0.0
40～44歳	男性	32 100.0	3 9.4	<b>29</b> <b>90.6</b>	0 0.0
	女性	71 100.0	11 15.5	60 84.5	0 0.0
45～49歳	男性	43 100.0	4 9.3	<b>38</b> <b>88.4</b>	1 2.3
	女性	61 100.0	8 13.1	<b>53</b> <b>86.9</b>	0 0.0
50～54歳	男性	40 100.0	6 15.0	34 85.0	0 0.0
	女性	50 100.0	6 12.0	<b>44</b> <b>88.0</b>	0 0.0
55～59歳	男性	35 100.0	<b>11</b> <b>31.4</b>	23 65.7	1 2.9
	女性	63 100.0	<b>13</b> <b>20.6</b>	49 77.8	1 1.6
60～64歳	男性	56 100.0	5 8.9	<b>49</b> <b>87.5</b>	2 3.6
	女性	65 100.0	10 15.4	54 83.1	1 1.5
65～69歳	男性	46 100.0	<b>9</b> <b>19.6</b>	34 73.9	3 6.5
	女性	75 100.0	<b>18</b> <b>24.0</b>	55 73.3	2 2.7
70～74歳	男性	61 100.0	<b>13</b> <b>21.3</b>	44 72.1	4 6.6
	女性	87 100.0	<b>18</b> <b>20.7</b>	62 71.3	7 8.0
75～79歳	男性	29 100.0	<b>6</b> <b>20.7</b>	21 72.4	2 6.9
	女性	53 100.0	6 11.3	35 66.0	12 22.6
80歳以上	男性	36 100.0	<b>8</b> <b>22.2</b>	25 69.4	3 8.3
	女性	62 100.0	6 9.7	44 71.0	12 19.4

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	知っている	知らない	無回答
全体		1,275 100.0	183 14.4	1,037 81.3	55 4.3
ブロック別	東部A	91 100.0	<b>23</b> <b>25.3</b>	64 70.3	4 4.4
	東部B	80 100.0	14 17.5	57 71.3	9 11.3
	北部A	113 100.0	14 12.4	97 85.8	2 1.8
	北部B	72 100.0	12 16.7	58 80.6	2 2.8
	中央東部	140 100.0	21 15.0	117 83.6	2 1.4
	南東部	108 100.0	9 8.3	<b>95</b> <b>88.0</b>	4 3.7
	中央部	177 100.0	19 10.7	<b>153</b> <b>86.4</b>	5 2.8
	中央南部	205 100.0	33 16.1	165 80.5	7 3.4
	南西部	125 100.0	15 12.0	101 80.8	9 7.2
	西部A	55 100.0	8 14.5	43 78.2	4 7.3
	西部B	74 100.0	13 17.6	57 77.0	4 5.4


## 10 その他

### (51) 新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大による生活への影響

問 29. 新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大により、あなたの生活に次のような影響はありましたか。該当するものを選んでください。(あてはまるものすべてに○)

新型コロナウイルスの影響は、「外出する機会の減少」が7割強

- 新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大による生活への影響について、「外出する機会の減少」が71.4%で最も高く、「知人、友人と話す機会の減少」が58.1%と続く。



#### 【属性別特徴】

- 「知人、友人と話す機会の減少」の割合を性別で見ると、女性が高い。
- 「外出する機会の減少」の割合をブロック別で見ると、中央部、西部Aが全体の割合に比べて高い。
- 「知人、友人と話す機会の減少」の割合をブロック別で見ると、西部A・Bが、全体の割合に比べて高い。



◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	外出する機会の減少	知人、友人と話す機会の減少	ストレスの増加	運動不足	予防のたぐくくた	医療機関（病気の治療に）	体力の低下	生活リズムの乱れ	た経済的な余裕がなくなつ
全体		1,275 100.0	910 71.4	741 58.1	478 37.5	429 33.6	318 24.9	285 22.4	283 22.2	172 13.5	
性別	男性	491 100.0	348 70.9	250 50.9	160 32.6	155 31.6	112 22.8	104 21.2	124 25.3	72 14.7	
	女性	766 100.0	553 72.2	<b>485</b> <b>63.3</b>	315 41.1	269 35.1	200 26.1	180 23.5	155 20.2	97 12.7	
15～19歳	男性	21 100.0	<b>18</b> <b>85.7</b>	13 61.9	8 38.1	<b>12</b> <b>57.1</b>	<b>7</b> <b>33.3</b>	<b>9</b> <b>42.9</b>	<b>10</b> <b>47.6</b>	2 9.5	
	女性	27 100.0	18 66.7	14 51.9	10 37.0	<b>13</b> <b>48.1</b>	6 22.2	7 25.9	<b>12</b> <b>44.4</b>	3 11.1	
20～24歳	男性	18 100.0	13 72.2	11 61.1	<b>12</b> <b>66.7</b>	<b>7</b> <b>38.9</b>	3 16.7	<b>5</b> <b>27.8</b>	<b>9</b> <b>50.0</b>	<b>6</b> <b>33.3</b>	
	女性	24 100.0	<b>20</b> <b>83.3</b>	<b>16</b> <b>66.7</b>	<b>14</b> <b>58.3</b>	7 29.2	5 20.8	6 25.0	2 8.3	<b>5</b> <b>20.8</b>	
25～29歳	男性	17 100.0	<b>14</b> <b>82.4</b>	11 64.7	7 41.2	<b>7</b> <b>41.2</b>	4 23.5	3 17.6	2 11.8	<b>6</b> <b>35.3</b>	
	女性	28 100.0	20 71.4	15 53.6	9 32.1	5 17.9	6 21.4	3 10.7	0 0.0	3 10.7	
30～34歳	男性	19 100.0	<b>15</b> <b>78.9</b>	7 36.8	5 26.3	<b>8</b> <b>42.1</b>	2 10.5	5 26.3	2 10.5	<b>4</b> <b>21.1</b>	
	女性	38 100.0	29 76.3	<b>25</b> <b>65.8</b>	<b>20</b> <b>52.6</b>	12 31.6	11 28.9	7 18.4	8 21.1	5 13.2	
35～39歳	男性	33 100.0	<b>29</b> <b>87.9</b>	18 54.5	14 42.4	6 18.2	8 24.2	4 12.1	7 21.2	4 12.1	
	女性	59 100.0	<b>48</b> <b>81.4</b>	<b>45</b> <b>76.3</b>	<b>40</b> <b>67.8</b>	20 33.9	<b>24</b> <b>40.7</b>	12 20.3	14 23.7	8 13.6	
40～44歳	男性	32 100.0	<b>25</b> <b>78.1</b>	22 68.8	<b>19</b> <b>59.4</b>	12 37.5	8 25.0	7 21.9	6 18.8	<b>7</b> <b>21.9</b>	
	女性	71 100.0	<b>61</b> <b>85.9</b>	<b>51</b> <b>71.8</b>	<b>38</b> <b>53.5</b>	<b>29</b> <b>40.8</b>	<b>23</b> <b>32.4</b>	<b>21</b> <b>29.6</b>	17 23.9	12 16.9	
45～49歳	男性	43 100.0	29 67.4	22 51.2	<b>19</b> <b>44.2</b>	16 37.2	9 20.9	7 16.3	10 23.3	7 16.3	
	女性	61 100.0	40 65.6	<b>39</b> <b>63.9</b>	<b>26</b> <b>42.6</b>	15 24.6	12 19.7	10 16.4	10 16.4	<b>14</b> <b>23.0</b>	
50～54歳	男性	40 100.0	<b>31</b> <b>77.5</b>	11 27.5	14 35.0	12 30.0	10 25.0	10 25.0	8 20.0	5 12.5	
	女性	50 100.0	<b>42</b> <b>84.0</b>	<b>40</b> <b>80.0</b>	<b>27</b> <b>54.0</b>	<b>24</b> <b>48.0</b>	<b>18</b> <b>36.0</b>	<b>21</b> <b>42.0</b>	13 26.0	11 22.0	
55～59歳	男性	35 100.0	23 65.7	19 54.3	<b>15</b> <b>42.9</b>	11 31.4	7 20.0	9 25.7	9 25.7	6 17.1	
	女性	63 100.0	46 73.0	<b>41</b> <b>65.1</b>	26 41.3	21 33.3	15 23.8	10 15.9	10 15.9	6 9.5	
60～64歳	男性	56 100.0	36 64.3	29 51.8	11 19.6	15 26.8	11 19.6	8 14.3	13 23.2	5 8.9	
	女性	65 100.0	48 73.8	<b>42</b> <b>64.6</b>	26 40.0	21 32.3	19 29.2	10 15.4	10 15.4	5 7.7	
65～69歳	男性	46 100.0	29 63.0	22 47.8	11 23.9	12 26.1	9 19.6	6 13.0	9 19.6	5 10.9	
	女性	75 100.0	48 64.0	46 61.3	28 37.3	<b>33</b> <b>44.0</b>	18 24.0	17 22.7	17 22.7	10 13.3	
70～74歳	男性	61 100.0	42 68.9	24 39.3	10 16.4	16 26.2	15 24.6	9 14.8	14 23.0	6 9.8	
	女性	87 100.0	57 65.5	50 57.5	25 28.7	33 37.9	22 25.3	23 26.4	17 19.5	11 12.6	
75～79歳	男性	29 100.0	18 62.1	17 58.6	3 10.3	9 31.0	6 20.7	<b>8</b> <b>27.6</b>	<b>8</b> <b>27.6</b>	2 6.9	
	女性	53 100.0	34 64.2	23 43.4	10 18.9	11 20.8	12 22.6	12 22.6	13 24.5	2 3.8	
80歳以上	男性	36 100.0	22 61.1	<b>23</b> <b>63.9</b>	10 27.8	11 30.6	10 27.8	<b>12</b> <b>33.3</b>	<b>16</b> <b>44.4</b>	5 13.9	
	女性	62 100.0	39 62.9	35 56.5	15 24.2	23 37.1	8 12.9	<b>19</b> <b>30.6</b>	12 19.4	2 3.2	

10 その他

		サンプル数	家事負担の増加	仕事量の減少	学習する機会の減少	仕事量の増加	健康状態の悪化	家庭内事故の増加	特に影響はない	無回答	
全体		1,275 100.0	139 10.9	135 10.6	93 7.3	86 6.7	64 5.0	8 0.6	88 6.9	41 3.2	
性別	男性	491 100.0	28 5.7	54 11.0	33 6.7	37 7.5	30 6.1	1 0.2	37 7.5	14 2.9	
	女性	766 100.0	109 14.2	78 10.2	59 7.7	49 6.4	34 4.4	7 0.9	48 6.3	25 3.3	
性別・年代別	15～19歳	男性	21 100.0	2 9.5	1 4.8	11 52.4	1 4.8	2 9.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	27 100.0	0 0.0	1 3.7	6 22.2	1 3.7	1 3.7	0 0.0	1 3.7	0 0.0
	20～24歳	男性	18 100.0	1 5.6	1 5.6	2 11.1	1 5.6	3 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		女性	24 100.0	2 8.3	3 12.5	2 8.3	3 12.5	1 4.2	1 4.2	1 4.2	0 0.0
	25～29歳	男性	17 100.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	4 23.5	1 5.9	0 0.0	1 5.9	0 0.0
		女性	28 100.0	1 3.6	2 7.1	0 0.0	3 10.7	1 3.6	0 0.0	2 7.1	1 3.6
	30～34歳	男性	19 100.0	1 5.3	3 15.8	0 0.0	2 10.5	0 0.0	0 0.0	1 5.3	1 5.3
		女性	38 100.0	5 13.2	6 15.8	3 7.9	5 13.2	3 7.9	1 2.6	2 5.3	1 2.6
	35～39歳	男性	33 100.0	1 3.0	2 6.1	3 9.1	6 18.2	0 0.0	0 0.0	3 9.1	0 0.0
		女性	59 100.0	18 30.5	5 8.5	6 10.2	7 11.9	3 5.1	2 3.4	3 5.1	0 0.0
	40～44歳	男性	32 100.0	2 6.3	8 25.0	2 6.3	6 18.8	3 9.4	0 0.0	0 0.0	1 3.1
		女性	71 100.0	19 26.8	6 8.5	7 9.9	9 12.7	0 0.0	0 0.0	1 1.4	1 1.4
	45～49歳	男性	43 100.0	2 4.7	9 20.9	1 2.3	7 16.3	3 7.0	0 0.0	4 9.3	0 0.0
		女性	61 100.0	15 24.6	12 19.7	5 8.2	9 14.8	3 4.9	0 0.0	3 4.9	2 3.3
	50～54歳	男性	40 100.0	3 7.5	5 12.5	3 7.5	1 2.5	2 5.0	0 0.0	2 5.0	0 0.0
		女性	50 100.0	17 34.0	8 16.0	4 8.0	2 4.0	6 12.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0
	55～59歳	男性	35 100.0	3 8.6	3 8.6	1 2.9	4 11.4	3 8.6	1 2.9	2 5.7	1 2.9
		女性	63 100.0	8 12.7	6 9.5	1 1.6	4 6.3	2 3.2	1 1.6	4 6.3	0 0.0
	60～64歳	男性	56 100.0	3 5.4	8 14.3	2 3.6	2 3.6	0 0.0	0 0.0	5 8.9	1 1.8
		女性	65 100.0	8 12.3	9 13.8	3 4.6	1 1.5	0 0.0	0 0.0	3 4.6	1 1.5
	65～69歳	男性	46 100.0	2 4.3	4 8.7	2 4.3	0 0.0	2 4.3	0 0.0	6 13.0	4 8.7
		女性	75 100.0	6 8.0	6 8.0	4 5.3	2 2.7	1 1.3	0 0.0	9 12.0	2 2.7
	70～74歳	男性	61 100.0	3 4.9	5 8.2	1 1.6	1 1.6	3 4.9	0 0.0	5 8.2	3 4.9
		女性	87 100.0	5 5.7	10 11.5	4 4.6	2 2.3	6 6.9	0 0.0	8 9.2	5 5.7
	75～79歳	男性	29 100.0	2 6.9	3 10.3	0 0.0	0 0.0	2 6.9	0 0.0	5 17.2	1 3.4
		女性	53 100.0	2 3.8	2 3.8	7 13.2	1 1.9	1 1.9	0 0.0	4 7.5	7 13.2
	80歳以上	男性	36 100.0	3 8.3	1 2.8	5 13.9	1 2.8	5 13.9	0 0.0	3 8.3	2 5.6
		女性	62 100.0	3 4.8	1 1.6	7 11.3	0 0.0	6 9.7	1 1.6	7 11.3	5 8.1

◆表 ブロック別◆

	サンプル数	外出する機会の減少	減知人、友人と話す機会の減少	ストレスの増加	運動不足	行きにくくなった	医療機関（病気の治療や予防のための通院等）に	体力の低下	生活リズムの乱れ	た経済的な余裕がなくなっ
全 体	1,275 100.0	910 71.4	741 58.1	478 37.5	429 33.6	318 24.9	285 22.4	283 22.2	172 13.5	
ブロック別	東部A	91 100.0	68 74.7	55 60.4	33 36.3	24 26.4	27 29.7	20 22.0	23 25.3	15 16.5
	東部B	80 100.0	60 75.0	49 61.3	26 32.5	19 23.8	22 27.5	13 16.3	21 26.3	15 18.8
	北部A	113 100.0	81 71.7	63 55.8	52 46.0	47 41.6	34 30.1	30 26.5	33 29.2	14 12.4
	北部B	72 100.0	51 70.8	41 56.9	27 37.5	25 34.7	15 20.8	15 20.8	16 22.2	13 18.1
	中央東部	140 100.0	100 71.4	84 60.0	61 43.6	47 33.6	25 17.9	31 22.1	33 23.6	11 7.9
	南東部	108 100.0	76 70.4	60 55.6	32 29.6	36 33.3	20 18.5	28 25.9	19 17.6	16 14.8
	中央部	177 100.0	136 76.8	109 61.6	69 39.0	68 38.4	43 24.3	44 24.9	35 19.8	13 7.3
	中央南部	205 100.0	141 68.8	118 57.6	72 35.1	69 33.7	49 23.9	44 21.5	47 22.9	34 16.6
	南西部	125 100.0	86 68.8	66 52.8	47 37.6	41 32.8	32 25.6	26 20.8	22 17.6	17 13.6
	西部A	55 100.0	42 76.4	35 63.6	20 36.4	15 27.3	14 25.5	9 16.4	15 27.3	7 12.7
	西部B	74 100.0	50 67.6	48 64.9	27 36.5	23 31.1	25 33.8	16 21.6	11 14.9	10 13.5
		サンプル数	家事負担の増加	仕事量の減少	学習する機会の減少	仕事量の増加	健康状態の悪化	家庭内事故の増加	特に影響はない	無回答
全 体	1,275 100.0	139 10.9	135 10.6	93 7.3	86 6.7	64 5.0	8 0.6	88 6.9	41 3.2	
ブロック別	東部A	91 100.0	9 9.9	9 9.9	6 6.6	6 6.6	4 4.4	0 0.0	5 5.5	4 4.4
	東部B	80 100.0	7 8.8	5 6.3	11 13.8	6 7.5	3 3.8	1 1.3	5 6.3	6 7.5
	北部A	113 100.0	15 13.3	13 11.5	8 7.1	9 8.0	4 3.5	0 0.0	9 8.0	3 2.7
	北部B	72 100.0	9 12.5	7 9.7	5 6.9	6 8.3	6 8.3	0 0.0	4 5.6	3 4.2
	中央東部	140 100.0	21 15.0	17 12.1	12 8.6	16 11.4	7 5.0	2 1.4	6 4.3	3 2.1
	南東部	108 100.0	9 8.3	9 8.3	12 11.1	1 0.9	6 5.6	1 0.9	10 9.3	4 3.7
	中央部	177 100.0	24 13.6	15 8.5	12 6.8	20 11.3	6 3.4	0 0.0	9 5.1	4 2.3
	中央南部	205 100.0	23 11.2	27 13.2	12 5.9	13 6.3	3 6.3	2 1.0	16 7.8	4 2.0
	南西部	125 100.0	13 10.4	16 12.8	6 4.8	2 1.6	6 4.8	1 0.8	13 10.4	3 2.4
	西部A	55 100.0	2 3.6	5 9.1	5 9.1	0 0.0	2 3.6	0 0.0	5 9.1	2 3.6
	西部B	74 100.0	4 5.4	8 10.8	3 4.1	5 6.8	4 5.4	0 0.0	4 5.4	4 5.4

## 10 その他

### 【設問間別特徴】

- 「ストレスの増加」、「低力の低下」の割合をケガの状況別で見ると、けがをした人が全体の割合に比べて高い。
- 「ストレスの増加」、「経済的な余裕がなくなった」の割合を自殺願望又は自殺未遂の経験別で見ると、自殺したいと思ったことがある人が全体の割合に比べて高い。

◆表 ケガの状況別◆

		サンプル数	外出する機会の減少	減少、友人と話す機会の減少	ストレスの増加	運動不足	予防のために通院等	医療機関（病気の治療や）	体力の低下	生活リズムの乱れ	た経済的な余裕がなくなつ
全体		1,275 100.0	910 71.4	741 58.1	478 37.5	429 33.6	318 24.9	285 22.4	283 22.2	172 13.5	
ケガ別の状況	ケガをした	322 100.0	233 72.4	203 63.0	<b>137</b> <b>42.5</b>	114 35.4	94 29.2	<b>90</b> <b>28.0</b>	84 26.1	53 16.5	
	ケガはしてない	943 100.0	671 71.2	533 56.5	340 36.1	313 33.2	222 23.5	194 20.6	199 21.1	119 12.6	
		サンプル数	家事負担の増加	仕事量の減少	学習する機会の減少	仕事量の増加	健康状態の悪化	家庭内事故の増加	特に影響はない	無回答	
全体		1,275 100.0	139 10.9	135 10.6	93 7.3	86 6.7	64 5.0	8 0.6	88 6.9	41 3.2	
ケガ別の状況	ケガをした	322 100.0	49 15.2	33 10.2	26 8.1	24 7.5	27 8.4	6 1.9	16 5.0	10 3.1	
	ケガはしてない	943 100.0	90 9.5	102 10.8	66 7.0	62 6.6	36 3.8	2 0.2	72 7.6	30 3.2	

◆表 自殺願望又は自殺未遂の経験別◆

		サンプル数	外出する 機会の減少	知人、 友人と話す 機会の 減少	スト レスの 増加	運 動不 足	予 防の ため にく くな った	医 療機 関(病 気の 治療 等に よる)	体 力の 低下	生 活リ ズム の乱 れ	た 経済 的な 余裕 がな くな った
全体		1,275 100.0	910 71.4	741 58.1	478 37.5	429 33.6	318 24.9	285 22.4	283 22.2	172 13.5	
は自殺 願望 未遂 の 経験 別	自殺未遂の経験がある	28 100.0	18 64.3	16 57.1	13 46.4	11 39.3	5 17.9	9 32.1	7 25.0	7 25.0	
	自殺したいと思ったことがある	291 100.0	212 72.9	177 60.8	143 49.1	95 32.6	66 22.7	72 24.7	68 23.4	54 18.6	
	自殺したいと思ったことがない	906 100.0	661 73.0	535 59.1	314 34.7	312 34.4	242 26.7	191 21.1	201 22.2	107 11.8	
		サンプル数	家事 負担 の増 加	仕 事量 の減 少	学 習す る機 会の 減少	仕 事量 の増 加	健 康状 態の 悪化	家 庭内 事故 の増 加	特 に影 響は ない	無 回答	
全体		1,275 100.0	139 10.9	135 10.6	93 7.3	86 6.7	64 5.0	8 0.6	88 6.9	41 3.2	
は自殺 願望 未遂 の 経験 別	自殺未遂の経験がある	28 100.0	2 7.1	7 25.0	2 7.1	2 7.1	1 3.6	0 0.0	1 3.6	1 3.6	
	自殺したいと思ったことがある	291 100.0	46 15.8	32 11.0	21 7.2	31 10.7	22 7.6	4 1.4	14 4.8	10 3.4	
	自殺したいと思ったことがない	906 100.0	91 10.0	95 10.5	68 7.5	53 5.8	38 4.2	4 0.4	67 7.4	14 1.5	


## 10 その他

### (52) 子育てに関する相談窓口の認知状況

問 30-1. あなたは、次のような公的相談窓口を知っていますか。(どちらかに○)

子育てに関する相談窓口を「知っている」人は6割弱

- 子育てに関する相談窓口の認知状況について、「知っている」が59.6%、「知らなかった」が34.4%である。



#### 【属性別特徴】

- 「知っている」の割合を性別で見ると、女性が高い。
- 「知っている」の割合をブロック別で見ると、東部Bが全体の割合に比べて高い。

◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	知っている	知らなかった	無回答
全体		1,275 100.0	760 59.6	438 34.4	77 6.0
性別	男性	491 100.0	256 52.1	211 43.0	24 4.9
	女性	766 100.0	497 64.9	219 28.6	50 6.5
15～19歳	男性	21 100.0	13 61.9	8 38.1	0 0.0
	女性	27 100.0	16 59.3	11 40.7	0 0.0
20～24歳	男性	18 100.0	7 38.9	11 61.1	0 0.0
	女性	24 100.0	13 54.2	11 45.8	0 0.0
25～29歳	男性	17 100.0	8 47.1	9 52.9	0 0.0
	女性	28 100.0	18 64.3	9 32.1	1 3.6
30～34歳	男性	19 100.0	9 47.4	9 47.4	1 5.3
	女性	38 100.0	24 63.2	13 34.2	1 2.6
35～39歳	男性	33 100.0	16 48.5	17 51.5	0 0.0
	女性	59 100.0	40 67.8	17 28.8	2 3.4
40～44歳	男性	32 100.0	21 65.6	10 31.3	1 3.1
	女性	71 100.0	47 66.2	22 31.0	2 2.8
45～49歳	男性	43 100.0	20 46.5	23 53.5	0 0.0
	女性	61 100.0	44 72.1	15 24.6	2 3.3
50～54歳	男性	40 100.0	27 67.5	13 32.5	0 0.0
	女性	50 100.0	35 70.0	15 30.0	0 0.0
55～59歳	男性	35 100.0	17 48.6	17 48.6	1 2.9
	女性	63 100.0	48 76.2	15 23.8	0 0.0
60～64歳	男性	56 100.0	28 50.0	27 48.2	1 1.8
	女性	65 100.0	50 76.9	15 23.1	0 0.0
65～69歳	男性	46 100.0	20 43.5	22 47.8	4 8.7
	女性	75 100.0	49 65.3	22 29.3	4 5.3
70～74歳	男性	61 100.0	30 49.2	25 41.0	6 9.8
	女性	87 100.0	45 51.7	30 34.5	12 13.8
75～79歳	男性	29 100.0	17 58.6	8 27.6	4 13.8
	女性	53 100.0	28 52.8	12 22.6	13 24.5
80歳以上	男性	36 100.0	20 55.6	10 27.8	6 16.7
	女性	62 100.0	37 59.7	12 19.4	13 21.0

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	知っている	知らなかった	無回答
全体		1,275 100.0	760 59.6	438 34.4	77 6.0
ブロック別	東部A	91 100.0	53 58.2	33 36.3	5 5.5
	東部B	80 100.0	52 65.0	20 25.0	8 10.0
	北部A	113 100.0	68 60.2	41 36.3	4 3.5
	北部B	72 100.0	39 54.2	28 38.9	5 6.9
	中央東部	140 100.0	90 64.3	45 32.1	5 3.6
	南東部	108 100.0	68 63.0	31 28.7	9 8.3
	中央部	177 100.0	103 58.2	65 36.7	9 5.1
	中央南部	205 100.0	127 62.0	64 31.2	14 6.8
	南西部	125 100.0	72 57.6	46 36.8	7 5.6
	西部A	55 100.0	32 58.2	18 32.7	5 9.1
	西部B	74 100.0	39 52.7	30 40.5	5 6.8


## 10 その他

### (53) 配偶者や恋人からの暴力に関する相談窓口の認知状況

問 30-2. あなたは、次のような公的相談窓口を知っていますか。(どちらかに○)

配偶者や恋人からの暴力に関する相談窓口を「知っている」人は5割弱

- 配偶者や恋人からの暴力に関する相談窓口の認知状況について、「知っている」が48.9%、「知らなかった」が44.5%である。



#### 【属性別特徴】

- 「知っている」の割合を性別・年代別で見ると、男性・50～54歳、女性・35～39歳、女性・45～69歳が、全体の割合に比べて高い。
- 「知っている」の割合をブロック別で見ると、東部B、北部Aが、全体の割合に比べて高い。



◆表 性別・年代別◆

		サンプル数	知っている	知らなかった	無回答
全体		1,275 100.0	624 48.9	568 44.5	83 6.5
性別	男性	491 100.0	211 43.0	<b>255</b> <b>51.9</b>	25 5.1
	女性	766 100.0	408 53.3	303 39.6	55 7.2
15~19歳	男性	21 100.0	<b>13</b> <b>61.9</b>	8 38.1	0 0.0
	女性	27 100.0	12 44.4	<b>15</b> <b>55.6</b>	0 0.0
20~24歳	男性	18 100.0	5 27.8	<b>13</b> <b>72.2</b>	0 0.0
	女性	24 100.0	10 41.7	<b>14</b> <b>58.3</b>	0 0.0
25~29歳	男性	17 100.0	8 47.1	<b>9</b> <b>52.9</b>	0 0.0
	女性	28 100.0	13 46.4	<b>14</b> <b>50.0</b>	1 3.6
30~34歳	男性	19 100.0	7 36.8	<b>11</b> <b>57.9</b>	1 5.3
	女性	38 100.0	20 52.6	17 44.7	1 2.6
35~39歳	男性	33 100.0	12 36.4	<b>21</b> <b>63.6</b>	0 0.0
	女性	59 100.0	<b>37</b> <b>62.7</b>	22 37.3	0 0.0
40~44歳	男性	32 100.0	17 53.1	14 43.8	1 3.1
	女性	71 100.0	36 50.7	33 46.5	2 2.8
45~49歳	男性	43 100.0	13 30.2	<b>30</b> <b>69.8</b>	0 0.0
	女性	61 100.0	<b>36</b> <b>59.0</b>	23 37.7	2 3.3
50~54歳	男性	40 100.0	<b>28</b> <b>70.0</b>	12 30.0	0 0.0
	女性	50 100.0	<b>30</b> <b>60.0</b>	20 40.0	0 0.0
55~59歳	男性	35 100.0	17 48.6	17 48.6	1 2.9
	女性	63 100.0	<b>39</b> <b>61.9</b>	24 38.1	0 0.0
60~64歳	男性	56 100.0	22 39.3	<b>34</b> <b>60.7</b>	0 0.0
	女性	65 100.0	<b>44</b> <b>67.7</b>	21 32.3	0 0.0
65~69歳	男性	46 100.0	17 37.0	<b>25</b> <b>54.3</b>	4 8.7
	女性	75 100.0	<b>48</b> <b>64.0</b>	22 29.3	5 6.7
70~74歳	男性	61 100.0	24 39.3	<b>32</b> <b>52.5</b>	5 8.2
	女性	87 100.0	39 44.8	36 41.4	12 13.8
75~79歳	男性	29 100.0	13 44.8	12 41.4	4 13.8
	女性	53 100.0	23 43.4	16 30.2	14 26.4
80歳以上	男性	36 100.0	14 38.9	13 36.1	9 25.0
	女性	62 100.0	18 29.0	26 41.9	18 29.0

◆表 ブロック別◆

		サンプル数	知っている	知らなかった	無回答
全体		1,275 100.0	624 48.9	568 44.5	83 6.5
ブロック別	東部A	91 100.0	46 50.5	39 42.9	6 6.6
	東部B	80 100.0	<b>44</b> <b>55.0</b>	27 33.8	9 11.3
	北部A	113 100.0	<b>62</b> <b>54.9</b>	47 41.6	4 3.5
	北部B	72 100.0	29 40.3	<b>38</b> <b>52.8</b>	5 6.9
	中央東部	140 100.0	66 47.1	68 48.6	6 4.3
	南東部	108 100.0	55 50.9	43 39.8	10 9.3
	中央部	177 100.0	87 49.2	82 46.3	8 4.5
	中央南部	205 100.0	107 52.2	86 42.0	12 5.9
	南西部	125 100.0	58 46.4	60 48.0	7 5.6
	西部A	55 100.0	21 38.2	27 49.1	7 12.7
	西部B	74 100.0	34 45.9	33 44.6	7 9.5